Приложение 1

Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
Раздел 1. Анестетики, препараты для предоперационной подготовки и медицинские газы				
Глава 1. Общие анестетики и кислород				
§ 1. Ингаляционные анестетики				
1	Изофлуран	Isofluranum	Препарат выбора для поддержания анестезии при плановых операциях у взрослых	N01AB06
2	Севофлуран	Sevofluranum	Золотой стандарт для ингаляционной индукции, особенно в педиатрической практике, а также при кратковременных вмешательствах	N01AB08
3	Азота оксид	Nitrous oxidum	Адъювант для снижения дозы и стоимости базового ингаляционного анестетика (изофлурана или севофлурана), особенно при болезненных операциях	R07AX01
4	Кислород	Oxygenum	Необходим для функционирования наркозных аппаратов	V03AN01
§ 2. Инъекционные лекарственные средства				
5	Кетамин	Ketaminum	[с] Препарат выбора при гиповолемическом и травматическом шоке, базовый препарат для анестезии в условиях ограниченных ресурсов, где нет возможности обеспечить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) или стабильный мониторинг гемодинамики	N01AX03
6	Пропофол*	Propofolum	Базовый препарат для стандартной анестезии в стационарных условиях с ИВЛ	N01AX10

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Альтернативные лекарственные средства				
7	Тиопентал натрия	Thiopentalum natrium	*Препарат резерва для индукции анестезии, когда пропофол недоступен или противопоказан	N01AF03
8	Дексметедомидин	Dexmedetomidinum	*Седация у взрослых пациентов и детей старше 12 лет, находящихся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, седация у неинтубированных пациентов до и (или) во время диагностических или хирургических вмешательств	N05CM18
§ 3. Местные анестетики				
9	Бупивакаин □	Bupivacainum	Препарат выбора для длительных хирургических операций, послеоперационной эпидуральной анестезии и спинальной анестезии при кесаревом сечении	N01BB01
10	Лидокаин □	Lidocainum	Препарат первого выбора для всех видов местной анестезии, кроме длительных (более 2 часов) хирургических вмешательств	N01BB02
11	Артикаин + эпинефрин	Articaine + epinephrine	Золотой стандарт в стоматологии	N01BB58
Альтернативные лекарственные средства				
12	Прокаин	Procainum	Местный анестетик средней продолжительности действия	N01BA02
13	Лидокаин + эпинефрин (адреналин)	Lidocainum + epinephrinum (adrenalinum)	Специализированная форма для стоматологии и хирургии, где требуется «сухое поле» и пролонгированная анестезия	N01BB52
Глава 2. Лекарственные средства для предоперационной терапии и кратковременных процедур				
14	Атропин	Atropinum	[с] Антихолинергическое средство для профилактики брадикардии (особенно при использовании пропофола, суксаметония) и уменьшения саливации (особенно при использовании кетамина)	A03BA01
15	Морфин***	Morphinum	Базовый опиоид для премедикации	N02AA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
16	Мидазолам** □	Midazolamum	Премедикация, седация, профилактика галлюцинаций при применении кетамина	N05CD08
Глава 3. Медицинские газы				
17	Кислород*	Oxygenum	*Для начала реанимации новорожденных на сроке менее 32 недель. *Использование при ведении гипоксемии	V03AN01
Раздел 2. Лекарственные средства от боли и препараты для паллиативной помощи				
Глава 4. Неопиодные и нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (далее – НПВС)				
18	Ибупрофен [a]	Ibuprofenum	*Препарат первого выбора среди НПВС. Меры предосторожности: при длительном применении (более 2 недель) возрастает риск гастропатии и кардиоваскулярных событий. [a] – не использовать у детей в возрасте младше 3 месяцев	M01AE01
19	Парацетамол □	Paracetamolum	Препарат первого выбора для слабой и умеренной боли, особенно у детей, пожилых и пациентов с противопоказаниями к НПВС. Внутривенная форма обязательна в стационарах. [c] – боль у детей до 3 месяцев	N02BE01
20	Диклофенак*	Diclofenacum	*Препарат выбора для острой воспалительной боли и хронической артропатической боли при отсутствии кардиоваскулярного риска и коротких курсах (до 7 дней). *Включен в клинические протоколы по лечению хронической боли в качестве 1 ступени лечения боли. Меры предосторожности: при длительном применении повышает риск инфаркта и инсульта (сопоставим с коксибами)	M01AB05
Альтернативные лекарственные средства				
21	Ацетилсалициловая кислота*	Acidum acetylsalicylicum	[a] – детям до 12 лет противопоказан. *Препарат второй линии среди НПВС	N02BA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
22	Кетопрофен	Ketoprofenum	Меры предосторожности: повышенный риск серьезных (иногда смертельных) сердечно-сосудистых тромботических событий (например, инфаркт миокарда, инсульт), серьезных желудочно-кишечных осложнений (например, кровотечения, язвы, перфорации желудка или кишечника). Противопоказан при проведении операции аортокоронарного шунтирования	M01AE03
Глава 5. Опиоидные анальгетики				
23	Морфин*** □	Morphinum	Золотой стандарт при умеренной до сильной боли, от острой до хронической. *Включен в клиническое руководство по лечению боли 2, 3 ступени	N02AA01
24	Трамадол*** □	Tramadolum	*Включен в клиническое руководство по лечению боли 1, 2 ступени	N02AX02
25	***Тримеперидин*	Trimeperidinum	*Включен в клиническое руководство по лечению боли 2, 3 ступени	N01AH
Альтернативные лекарственные средства				
26	Фентанил*** □	Fentanylum	Препарат резерва для пациентов со стабильной хронической болью, которые не могут принимать пероральный морфин (дисфагия, рвота, непроходимость желудочно-кишечного тракта) или имеют почечную недостаточность	N01AH01
27	***Метадон*	Methadonum	Препарат резерва для нейропатической онкологической боли при неэффективности морфина и адъювантов	N07BC02
Глава 6. Лекарственные средства, применяемые при других распространенных симптомах по паллиативной помощи				
28	Амитриптилин**	Amitriptylinum	При нейропатической боли (10–25 мг на ночь)	N06AA09
29	Габапентин**	Gabapentinum	Препарат первой линии для нейропатической боли по ВОЗ	N03AX12
30	Дексаметазон [с]	Dexamethasonum	Боль при костных метастазах, отек мозга, компрессия нервов, тошнота	H02AB02
31	Диазепам**	Diazepamum	Седация и снятие судорог	N05BA01
32	**Мидазолам*	Midazolamum	Терминальная седация, тревога, судороги	N05CD08
33	Галоперидол**	Haloperidolum	Тошнота, делирий, терминальное возбуждение	N05AD01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
34	Метоклопрамид	Metoclopramidum	Первая линия при тошноте, вызванной опиоидами и гастростазом	A03FA01
35	Ондансетрон □	Ondansetronum	При тошноте и рвоте (химиотерапия, лучевая терапия), для случаев, где метоклопрамид неэффективен (химио-индуцированная рвота)	A04AA01
36	Лоперамид	Loperamidum	При диарее (в т. ч. опиоид-индуцированной при смене препарата)	A07DA03
37	Сенна	Senna	При запоре (опиоид-индуцированный)	A06AB06
38	Лактулоза [с]	Lactulose	При запоре (осмотический)	A06AD11
Альтернативные лекарственные средства				
39	Дротаверин	Drotaverinum	*Для симптоматического лечения	A03AD02
Раздел 3. Лекарственные средства для применения при аллергических реакциях и анафилаксии				
40	Эпинефрин □	Epinephrinum	Препарат первой линии при анафилактическом шоке	C01CA24
41	Гидрокортизон	Hydrocortisonum	Тяжелая анафилаксия с гипотензией (минералокортикоидный эффект, повышает артериальное давление), не лечит острые симптомы, предотвращает вторую волну (бифазную анафилаксию) – отсроченную реакцию, которая возникает у 5–20 % пациентов через 6–24 часа после первой волны	H02AB09
42	Преднизолон □	Prednisolonum	Предотвращение второй волны (отсроченной реакции), для анафилаксии средней тяжести, если нет выраженной гипотензии, для амбулаторного долечивания	H02AB06
43	Лоратадин □	Loratadinum	*Не применяется при анафилаксии как средство первой линии. Хроническая аллергия, крапивница, зуд	R06AX13
44	Хлоропирамин	Chloropyraminum	*Не применяется при анафилаксии как средство первой линии	R06AC03
Альтернативные лекарственные средства				
45	Цетиризин	Cetirizinum	*Предпочтительнее при острой крапивнице	R06AE07
46	Фексофенадин	Fexofenadinum	*Отсутствие седативного эффекта, особенно для лиц пожилого возраста	R06AX26

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
47	Дифенгидрамин	Diphenhydraminum	*При назначении препарата следует учитывать его побочный седативный эффект	R06AA02
Раздел 4. Антидоты и другие лекарственные средства, применяемые при отравлениях				
Глава 7. Неспецифические лекарственные средства				
48	Уголь активированный	Carbo activatus	*Препарат первого эмпирического выбора при любом пероральном отравлении неизвестным ядом	A07BA01
49	Дантролен	Dantrolenum	*При злокачественной гипертермии	M03CA01
Глава 8. Специфические лекарственные средства				
50	Атропин	Atropinum	*Антидот при передозировке холиномиметическими средствами, карбамата. Специфический антидот при отравлении фосфорорганическими соединениями (пестициды) и карбаматами	V03AB54
51	Ацетилцистеин	Acetylcysteinum	*Как антидот парацетомола	V03AB23
52	Кальция глюконат	Calcium gluconatum	*Отравление блокаторами кальциевых каналов и бета-блокаторами, укусы скорпионов, змей	B05XA19
53	Налоксон***	Naloxonum	*Антидот морфина	V03AB15
54	Метилтионина хлорид (метиленовая синь)	Methylthioninium chloridum	*При интоксикациях метгемоглобинообразователями (отравление цианидами, оксидом углерода, сероводородом)	V03AB17
55	Пеницилламин	Penicillaminum	*Болезнь Вильсона – Коновалова (накопление меди)	M01CC01
56	Натрия тиосульфат	Sodium thiosulfatum	*Отравление цианидами (промышленность, горение пластиков, дым пожаров)	V03AB06
57	Дефероксамин	Deferoxaminum	*Отравление препаратами железа, трасфузионный гемосидероз и идиопатический гемохроматоз	V03AC01
58	Фомепизол ±	Fomepizolum	*Отравление метанолом и этиленгликолем (антифриз, тормозная жидкость, суррогатный алкоголь)	V03AB34
59	Флумазенил	Flumazenilum	*Антидот бензодиазепинов	V03AB25

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
60	Ботулиновый антитоксин	Antitoxinum botulinum	*Специфический антидот ботулизма, ботулинический токсин типа А. Противопоказан при беременности и кормлении грудью	J06AA04
Раздел 5. Лекарственные средства при заболеваниях нервной системы				
Глава 9. Противосудорожные лекарственные средства				
61	Карбамазепин**	Carbamazepinum	Золотой стандарт для фокальной эпилепсии	N03AF01
62	Диазепам**	Diazepamum	Для купирования судорог у детей	N05BA01
63	Магния сульфат □	Magnesium sulfatum	Препарат при эклампсии и тяжелой преэклампсии	B05XA05
64	**Вальпроевая кислота*	Acidum valproicum	*Избегать применения при беременности, а также у женщин и девочек репродуктивного возраста из-за высокого риска развития врожденных дефектов и внутриутробных нарушений развития у детей под воздействием вальпроата, за исключением случаев, когда альтернативные методы лечения неэффективны или не переносятся. Препарат выбора для генерализованных идиопатических приступов	N03AG01
65	Мидазолам**	Midazolamum	Для купирования судорог у детей	N05CD08
Альтернативные лекарственные средства				
66	Ламотриджин** □	Lamotriginum	*Альтернативное средство при лечении резистентных форм генерализованных судорог у детей, женщин и лиц пожилого возраста, фокальная эпилепсия (альтернатива карбамазепину), абсансы	N03AX09
67	Леветирацетам**	Levetiracetamum	*Альтернатива фенобарбиталу	N03AX14
68	Фенобарбитал**	Phenobarbitalum		N03AA02
69	Лоразепам** □	Lorazepamum	*Для эпистатуса	N05BA06
70	Преднизолон [с]	Prednisolonum	*Синдром Веста, инфантильные спазмы	H02AB06
71	Фенитоин**	Phenytoinum	*При эпилептическом статусе (вторая линия), фокальная эпилепсия (резерв)	N03AB02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
72	Вигабатрин**	Vigabatrinum	*Для лечения парциальных судорог, препарат первого выбора для инфантильных спазмов (синдром Веста) вместе с преднизолоном	N03AG04
Глава 10. Лекарственные средства при рассеянном склерозе				
Альтернативные лекарственные средства (ПИТРС – препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (Disease Modifying Therapies, DMTs)				
73	Глатирамера ацетат	Glatiramerum acetatum	Базовый ПИТРС первой линии	L03AX13
74	Интерферон бета-1a/бета-1b	Interferonum beta-1a/beta-1b	ПИТРС первой линии	L03AB08
75	Кладрибин	Cladribinum	Препарат второй линии или препарат выбора для высокоактивного ремиттирующего рассеянного склероза (РРС) – иммунная реконституционная терапия	L01BB04
76	Ритуксимаб ±	Rituximabum	ПИТРС с высокой эффективностью ([c] – off-label), эффективен при первично-прогрессирующем рассеянном склерозе	L01XC02
Глава 11. Лекарственные средства при деменции				
77	Мемантин	Memantinum	*Лечение деменции	N06DX01
Глава 12. Лекарственные средства для паркинсонизма				
78	Леводопа + карбидопа**	Levodopa + carbidopa	Основа терапии для пациентов старше 65 лет и на поздних стадиях	N04BA02
79	Бипериден** □	Biperiden	Тремор, лекарственный паркинсонизм. Не рекомендуется для лечения болезни Паркинсона у пациентов пожилого возраста. Рекомендуется применять при лекарственно-индуцированном паркинсонизме и треморе у пациентов молодого возраста	N04AA02
Альтернативные лекарственные средства				
80	Тригексифенидил**	Trihexyphenidylum	*Альтернатива бипериденту	N04AA01
Глава 13. Лекарственные средства от детского церебрального паралича				
81	Баклофен	Baclofen	*Проникает в грудное молоко.	M03BX01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
			Меры предосторожности: не допускать резкого прекращения интратекального введения баклофена в связи с риском развития гипертермии, нарушений психического состояния, усиления спастичности и мышечной ригидности. В редких случаях возможно развитие рабдомиолиза, полиорганной недостаточности и летального исхода	
82	Антитоксин ботулинический тип А, Е, В	Serum antibotulinum purificatum concentratum fluidum of type A, B, E	*При спастичности мышц	J06AA04
Глава 14. Лекарственные средства от головной боли				
§ 1. Лекарственные средства при острой мигрени				
83	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalycilic acidum	Купирование легкого/среднего приступа	N02BA01
84	Ибупрофен □	Ibuprofenum	Купирование легкого/среднего приступа	M01AE01
85	Парацетомол	Paracetomolum	Купирование легкого приступа при противопоказаниях к НПВС	N02BE01
86	Суматриптан □	Sumatriptanum	Купирование среднего/тяжелого приступа, при неэффективности НПВС	N02CC01
Альтернативные лекарственные средства				
87	Напроксен	Naproxenum	Альтернатива ибупрофену	M01AE02
§ 2. Лекарственные средства для профилактики мигрени				
88	Пропранолол	Propronololum	Контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС)	C07AA05
89	Амитриптиллин	Amitriptylinum	Для профилактики мигрени (особенно при коморбидной депрессии/бессоннице)	N06AA09
§ 3. Лекарственные средства при кластерной головной боли				
90	Преднизолон	Prednisolonum	Переходная профилактика, быстрое подавление цикла	H02AB06
91	Суматриптан	Sumatriptanum	Препарат выбора для купирования острого приступа	N02CC01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
92	Верапамил	Verapamilum	*Меры предосторожности: регулярное применение в течение всего кластерного периода, при применении в высоких дозах (240–480 мг/сут) необходим ЭКГ-контроль. Основа профилактической терапии, рекомендуется для долгосрочной профилактики	C08DA01
§ 4. Лекарственные средства, применяемые при инфекциях центральной нервной системы				
Лекарственные средства для лечения бактериальной инфекции центральной нервной системы				
93	Амоксициллин	Amoxicillinum	*Препарат второй линии при остром бактериальном менингите	J01CA04
94	Ампициллин	Ampicillinum	*Препарат второй линии при остром бактериальном менингите	J01CA01
95	Бензилпенициллин	Benzylpenicillinum	*Препарат второй линии при остром бактериальном менингите	J01CE01
96	Цефотаксим*	Cefotaximum	*Цефалоспорин III поколения, является препаратом выбора при остром бактериальном менингите для применения у госпитализированных новорожденных	J01DD01
97	Цефтриаксон* [a]	Ceftriaxonum	*Является препаратом выбора при остром бактериальном менингите. *Не назначается вместе с кальцием и противопоказан младенцам с гипербилирубинемией. [a] – при гестационном возрасте более 41 недели дозу рекомендуется корректировать с учетом гестационного возраста	J01DD04
98	Хлорамфеникол	Chloramphenicolum	*Только для предполагаемого лечения эпидемического менингита у детей старше 2 лет. *Препарат второго ряда при остром бактериальном менингите	J01BA01
99	Гентамицин	Gentamicinum	*Препарат выбора при остром бактериальном менингите у новорожденных [c]	J01GB03
100	Меропенем* [a]	Meropenemum	*Препарат второго ряда при остром бактериальном менингите у новорожденных. [c] [a] – старше 3 месяцев	J01DH02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Лекарственные средства для лечения вирусных инфекций центральной нервной системы				
101	□ Ацикловир	Aciclovirum	*Введение следует начинать немедленно, не дожидаясь результатов ПЦР-исследования. Обязателен при подозрении на герпетический энцефалит (лихорадка + головная боль + нарушение сознания + изменения на магнитно-резонансной томографии (МРТ) височных долей)	J05AB01
Альтернативные лекарственные средства				
102	Валацикловир	Valaciclovirum	*Альтернатива ацикловиру	J05AB11
Глава 15. Лекарственные средства при заболеваниях периферической нервной системы				
§ 1. Лекарственные средства при синдроме Гийена – Барре				
Альтернативные лекарственные средства				
103	Иммуноглобулин нормальный человеческий □	Human normal immunoglobulin	Базовый препарат для лечения синдрома Гийена – Барре	J06BA01 J06BA02
§ 2. Лекарственные средства для миастении гравис				
104	Неостигмин □	Neostigminum methylsulfas	*Базовый препарат для лечения миастении	N07AA01
105	Пиридостигмин □	Pyridostigminum	*Базовый препарат для длительной симптоматической терапии миастении гравис	N07AA02
§ 3. Лекарственные средства при хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии				
106	Иммуноглобулин нормальный человеческий	Human normal immunoglobulin	Для иммуноопосредованных нейропатий	J06BA01 J06BA02
107	Преднизолон	Prednisolonum	Для длительной иммуносупрессивной терапии миастении (стероид-сберегающий эффект азатиоприна)	H02AB06

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
108	Азатиоприн	Azathioprinum	Для длительной иммуносупрессивной терапии миастении	L04AX01
Раздел 6. Противомикробные лекарственные средства				
Глава 16. Противогельминтные средства				
Кишечные противогельминтные средства				
109	Альбендазол	Albendazolum	*Контролировать показатели крови в начале каждого 28-дневного цикла лечения альбендазолом и каждые 2 недели в течение всего лечения	P02CA03
110	Мебендазол	Mebendazolum		P02CA01
Глава 17. Антибактериальные средства				
В целях содействия рациональному использованию антибиотиков на национальном уровне и снижения риска развития антимикробной резистентности антибиотики представлены в соответствии с классификацией Access, Watch, Reserve (AWaRe), предусматривающей их распределение по группам с учетом особенностей применения и потенциала развития антимикробной резистентности				
Группа Access – антибиотики широкого доступа. К данной группе относятся антибиотики, активные в отношении широкого спектра часто встречающихся чувствительных возбудителей и характеризующиеся более низким потенциалом развития антимикробной резистентности по сравнению с антибиотиками других групп. Антибиотики данной группы рекомендуются в качестве основных препаратов первого или второго выбора для эмпирической терапии распространенных инфекционных синдромов и включаются в перечень жизненно важных лекарственных средств в целях обеспечения их доступности и содействия рациональному применению				
Группа Watch – антибиотики группы наблюдения. К данной группе относятся классы антибиотиков с более высоким потенциалом развития антимикробной резистентности, включая большинство приоритетных препаратов из числа критически важных антимикробных средств. Отдельные антибиотики данной группы рекомендуются в качестве препаратов первого или второго выбора для эмпирической терапии ограниченного перечня специфических инфекций				

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Группа Reserve – антибиотики резервной группы. К данной группе относятся антибиотики и классы антибиотиков, применение которых рекомендуется резервировать для лечения подтвержденных или предполагаемых инфекций, вызванных микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью. Антибиотики резервной группы рассматриваются в качестве препаратов последней надежды и применяются в случаях, когда иные варианты антибактериальной терапии отсутствуют либо являются неэффективными. Отдельные антибиотики включаются в перечни жизненно важных лекарственных средств при наличии благоприятного соотношения «польза – риск» и доказанной активности в отношении патогенов высокого приоритета, определенных Списком приоритетных бактериальных патогенов Всемирной организации здравоохранения, в том числе карбапенем-устойчивых Enterobacteriaceae				
§ 1. Группа широкого доступа (Access)				
111	Амикацин [r]	Amikacinum	Препарат первого выбора: высокий риск фебрильной нейтропении, тяжелая степень пиелонефрита или простатита. Препарат второго выбора: сепсис у новорожденных и детей [c]	J01GB06
112	Амоксициллин [r]	Amoxicillinum	Препарат первого выбора: внебольничная пневмония, обострения хронической обструктивной болезни легких (далее – ХОБЛ), средний отит, фарингит, синусит, сепсис у новорожденных и детей, неосложненное/осложненное тяжелое недоедание, прогрессирующий апикальный абсцесс зуба. Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит	J01CA04
113	Амоксициллин + клавулановая кислота* [r]	Amoxycillinum + clavulanic acid	Препарат первого выбора: тяжелая степень внебольничной пневмонии, осложненные внутриабдоминальные инфекции, обострения ХОБЛ, внутрибольничная пневмония, низкий риск фебрильной нейтропении, инфекции нижних мочевыделительных путей, синусит, инфекции кожи и мягких тканей. Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов, внебольничная пневмония, средний отит, хирургическая профилактика	J01CR02
114	Ампициллин [r]	Ampicillinum	Препарат первого выбора: тяжелая степень внебольничной пневмонии [c], осложненные внутриабдоминальные инфекции [c], осложненная тяжелая степень недоедания [c], сепсис у	J01CA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
			новорожденных и детей [с]. Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит	
115	Бензатин бензилпенициллин [r]	Benzathinibenzylpenicil-linum	Препарат первого выбора: сифилис	J01CE08
116	Бензилпенициллин [r]	Benzylpenicillinum	Препарат первого выбора: тяжелая степень внебольничной пневмонии [с], осложненная тяжелая степень недоедания [с], сепсис у новорожденных и детей [с], сифилис. Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит	J01CE01
117	Цефалексин [r]	Cefalexinum	Препарат первого выбора: инфекции кожи и мягких тканей. Препарат второго выбора: обострения ХОБЛ, фарингит	J01DB01
118	Цефазолин [a] [r]	Cefazolinum	Препарат первого выбора: хирургическая профилактика. Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов. [a] – детям старше 1 месяца	J01DB04
119	Хлорамфеникол [r]	Chloramphenicolum	*Только для пробного лечения эпидемического менингита у детей старше 2 лет. Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит	J01BA01
120	Клиндамицин [r]	Clindamycinum	Препарат первого выбора: некротизирующий фасциит. Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов	J01FF01
121	Доксициклин [a]	Doxycyclinum	Препарат первого выбора: холера, инфекции, передаваемые половым путем (далее – ИППП), включая хламидиоз. Препарат второго выбора: холера [с], внебольничная пневмония (легкой и средней тяжести), обострения ХОБЛ. [a] – использование у детей младше 8 лет только при наличии угрожающих жизни инфекций, когда нет альтернативы	J01AA02
122	Гентамицин [r]	Gentamicinum	Препарат первого выбора: острый бактериальный менингит [с], внебольничная пневмония тяжелой степени [с], осложненная внутриабдоминальная инфекция [с], осложненные нарушения питания [с], сепсис новорожденных и детей [с]. Препарат второго выбора: гонорея, хирургическая профилактика	J01GB03

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
123	Метронидазол [r]	Metronidazolum	Препарат первого выбора: инфекция, ассоциированная Clostridium difficale, осложненная внутриабдоминальная инфекция, некротизирующий фасциит, хирургическая профилактика, трихомониаз. Препарат второго выбора: осложненная внутриабдоминальная инфекция легкой и средней степени тяжести	J01XD01
124	Нитрофурантоин [r]	Nitrofurantoinum	[c] Препарат первого выбора: инфекции нижных мочевыводящих путей	J01XE01
125	Феноксиметилпенициллин [r]	Phenoxymethylpenicillinum	Препарат первого выбора: внебольничная пневмония легкой и средней тяжести, фарингит, прогрессирующий апикальный абсцесс зуба	J01CE02
126	Бензилпенициллин прокаин* [r]	Benzylpenicillinum procain	*Не рекомендуется в качестве первой линии лечения неонатального сепсиса, за исключением случаев высокой неонатальной смертности, при применении обученными медицинскими работниками в тех случаях, когда стационарное лечение недостижимо. Препарат первого выбора: сифилис (врожденный) [c]. Препарат второго выбора: сифилис	J01CE09
127	Сульфаметоксазол + триметоприм [r]	Sulfamethoxazolum + trimethoprim	Препарат первого выбора: инфекции нижних мочевыводящих путей. Препарат второго выбора: острая инвазивная диарея/бактериальная дизентерия	J01EE01
§ 2. Группа наблюдения (Watch)				
128	Азитромицин [r]	Azithromycinum	Препарат первого выбора: холера, энтеритная лихорадка, гонорея, ИППП, включая хламидии, трахома, фрамбезия. Препарат второго выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, гонорея	J01FA10
129	Цефиксим □ [r]	Cefiximum	Препарат второго выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, гонорея	J01DD08
130	Цефотаксим* [r]	Cefotaximum	*III поколение цефалоспоринов является выбором для применения у госпитализированных новорожденных.	J01DD01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
			Препарат первого выбора: острый бактериальный менингит, внебольничная пневмония тяжелой степени, осложненная внутриабдоминальная инфекция, госпитальная пневмония, пиелонефрит или простатит тяжелой степени. Препарат второго выбора: инфекции костей и суставов, пиелонефрит или простатит легкой и средней тяжести, сепсис у новорожденных и детей [c]	
131	Цефтриаксон* [a] [r]	Ceftriaxonum	*Не применять с кальцием и избегать применения у новорожденных с гипербилирубинемией. Препарат первого выбора: острый бактериальный менингит, внебольничная пневмония тяжелой степени, осложненная внутриабдоминальная инфекция, госпитальная пневмония, пиелонефрит или простатит тяжелой степени, эндофтальмит, энтеритная лихорадка, некротизирующий фасциит. Препарат второго выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, инфекции костей и суставов, пиелонефрит или простатит легкой и средней тяжести, сепсис у новорожденных и детей [c]. [a] – более 41 недели гестационного возраста	J01DD04
132	Цефуроксим [r]	Cefuroximum	Препарат второго выбора: хирургическая профилактика	J01DC02
133	Ципрофлоксацин [r]	Ciprofloxacinum	Препарат первого выбора: острая инвазивная бактериальная диарея/дизентерия, энтеритная лихорадка, фебрильная нейтропения низкого риска, пиелонефрит или простатит легкой и средней степени. Препарат второго выбора: холера, осложненная внутриабдоминальная инфекция легкой и средней степени тяжести	J01MA02
134	Кларитромицин* □ [r]	Clarithromycinum	*Использовать также в комбинированной эрадикационной терапии H. pylori у взрослых. Препарат первого выбора: внебольничная пневмония тяжелой	J01FA09

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
			степени. Препарат второго выбора: фарингит	
135	Эритромицин □ [r]	Erythromycinum	Препарат второго выбора: фарингит у детей	J01FA01
136	Пиперациллин + тазобактам [r]	Piperacillinum + tazobactam	Препарат первого выбора: осложненная внутриабдоминальная инфекция, фебрильная нейтропения высокого риска, госпитальная пневмония, некротизирующий фасциит	J01CR05
137	Ванкомицин □ [r]	Vancomycinum	*Порошок для инъекций можно использовать для перорального применения. Препарат второго выбора: инфекция, ассоциированная Clostridium difficile	J01XA01
Альтернативные лекарственные средства				
138	Имипенем + циластатин	Imipenem + cilastatinum	*Альтернатива меропенему	J01DH51
139	Цефтазидим [r]	Ceftazidimum	Препарат первого выбора: эндофтальмит	J01DD02
140	Меропенем □ [a] [r]	Meropenemum	*Рекомендуется в качестве предпочтительного препарата для лечения острого бактериального менингита у новорожденных. Препарат второго выбора: острый бактериальный менингит у новорожденных [c], осложненные внутрибрюшные инфекции, лихорадочная нейтропения высокого риска. [a] – старше 3 месяцев	J01DH02
141	Цефотаксим + сульбактам	Cefotaximum + sulbactamum	*Препарат для лечения внутрибольничных инфекций	J01DD51
§ 3. Резервная группа (Reserve)				
142	Цефтазидим + авибактам [r]	Ceftazidimum + avibactam	*Лечение осложненных внутрибрюшных инфекций и мочевыводящих путей, вызванных чувствительными штаммами E. coli, Citrobacter freundii, C. koseri, E. aerogenes, E. cloacae, K. pneumoniae, Proteus или Ps. aeruginosa	J01DD52
143	Цефепим + сульбактам	Cefepim + sulbactam	*Для лечения внутрибольничных инфекций	J01DE51

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
144	Фосфомицин [r]	Fosfomycinum	*Лечение неосложненных инфекций мочевыводящих путей (острого цистита) у женщин, вызванных чувствительными штаммами E. coli или Enterococcus faecalis, применяется в качестве периоперационной профилактики у мужчин, перенесших трансректальную биопсию предстательной железы (off-label)	J01XX01
145	Линезолид □ [r]	Linezolidum	*Лечение внутрибольничной пневмонии, вызванной чувствительными штаммами S. aureus (включая MRSA) или S. pneumoniae	J01XX08
Альтернативные лекарственные средства				
146	Цефидерокол [r] ±	Cefiderocolum	*Лечение внутрибольничной бактериальной пневмонии и вентилятор-ассоциированной бактериальной пневмонии (ВБП/ВАБП), вызванной чувствительными штаммами комплекса Acinetobacter baumannii, E. coli, комплекса Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Ps. aeruginosa и Serratia marcescens	J01DI04
147	Цефтолозан + тазобактам [r]	Ceftolozanum + tazobactamum	*Лечение осложненных внутрибрюшных инфекций, вызванных чувствительными штаммами E. colacae, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, Proteus mirabilis, Ps. aeruginosa, Bacteroides fragilis, S. anginosus, S. constellatus или S. salivarius, и осложненных инфекций мочевыводящих путей, включая пиелонефрит, вызванных чувствительными штаммами E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis или Ps. aeruginosa	J01DI54
148	Колистин [r]	Colistinum	*Риск нефротоксичности, нейротоксичности, гипокалиемии и метаболического алкалоза	J01XB01
149	Меропенем + ваборбактам [r]	Meropenemum + vaborbactam	*Лечение осложненных инфекций мочевыводящих путей у взрослых, вызванных чувствительными штаммами E. coli, K. pneumoniae или комплексом видов E. cloacae, включая пиелонефрит	J01DH52

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
150	Полимиксин В [r]	Polymyxinum B	*Вводится внутривенно, внутримышечно или интратекально только госпитализированным пациентам под постоянным наблюдением врача, риск нефротоксичности, нейротоксичности. Следует избегать одновременного назначения аминогликозидов	J01XB02
§ 4. Противотуберкулезные лекарственные средства				
151	Амикацин [r]	Amikacinum	*Риск ототоксичности, нефротоксичности, нейротоксичности. Следует избегать одновременного назначения сильнодействующих диуретиков	J01GB06
152	Амоксициллин + клавулановая кислота* [r]	Amoxicillinum + clavulanic acid*	*Только для использования в комбинации с меропенемом или имипенемом + циластатином	J01CR02
153	Бедаквилин [r]	Bedaquilinum	[c] *Риск удлинения интервала QT, следует проводить контроль ЭКГ	J04AK05
154	Клофазимин [r]	Clofaziminum	*В многокомпонентных схемах лечения МЛУ-ТБ (off-label). Меры предосторожности: розовая или коричневато-черная пигментация кожи, роговицы, конъюнктивы, слезной жидкости, которая становится очевидной в течение 1–4 недель после начала приема клофазимина. [c] – противопоказан детям младше 12 лет	J04BA01
155	Циклосерин □ [r]	Cycloserinum	*Лечение активного (клинического) туберкулеза в сочетании с другими противотуберкулезными препаратами. Препарат второго ряда, используемый для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, вызванного Mycobacterium tuberculosis	J04AB01
156	Деламанид* [r]	Delamanidum	[c] *Лечение туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Меры предосторожности: риск миелосупрессии, нейропатий, удлинение интервала QT, лактацидоза	J04AK06

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
157	Этамбутол [r]	Ethambutolum	*Препарат первой линии для лечения туберкулеза легких. Используется на начальном этапе интенсивного лечения для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза легких. Меры предосторожности: снижение остроты зрения, сужение полей зрения, развитие центральных и периферических скотом, а также потеря способности различать красный и зеленый цвета, гепатотоксичность	J04AK02
158	Этамбутол + изониазид + пиразинамид + рифампицин [r]	Ethambutolum + isoniazidum + pyrazinamide + rifampicinum		J04AM06
159	Этамбутол + изониазид + рифампицин [r]	Ethambutolum + isoniazidum + rifampicinum		J04AM07
160	Этионамид [r]	Ethionamidum	*Альтернатива: протионамид (для мультирезистентного туберкулеза). *Лечение активного (клинического) туберкулеза в сочетании с другими противотуберкулезными препаратами, препарат второй линии, применяемый для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Меры предосторожности: гепатотоксичность, гипогликемия, депрессия, сонливость, головокружение, гипотиреоз, периферический неврит, диплопия, оптический неврит, нечеткость зрения (проводить офтальмоскопию)	J04AD03
161	Изониазид [r]	Isoniazidum	Меры предосторожности: лекарственно-индуцированный гепатит (мониторинг аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ)	J04AC01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
162	Изониазид + пиразинамид + рифампицин [r]	Isoniazidum + pyrazinamide + rifampicin	[c]	J04AM05
163	Изониазид + рифампицин [r]	Isoniazidum + rifampicin		J04AM02
164	Изониазид + рифапентин [r]	Isoniazidum + rifapentine		J04AC51
165	Левофлоксацин	Levofloxacinum	Меры предосторожности: удлинение интервала QT, тендинит и разрыв сухожилий, периферическая нейропатия, поражение центральной нервной системы, мышечная слабость	J01MA12
166	Моксифлоксацин [r]	Moxifloxacinum	Меры предосторожности: удлинение интервала QT, тендинит и разрыв сухожилий, периферическая нейропатия, поражение центральной нервной системы, мышечная слабость	J01MA14
167	Меропенем □	Meropenemum	*Альтернатива: имипенем + циластатин	J01DH02
168	Натрия парааминосалицилат [r]	p-aminosalicylate sodium	Меры предосторожности: гипокалиемия, B12-дефицитная анемия, лекарственно-индуцированный гепатит, психоз, лимфоаденопатия, нарушение функции щитовидной железы	J04AA02
169	Претоманид [r]	Pretomanidum	*Легочный туберкулез с экстремальной лекарственной устойчивостью (XDR), непереносимостью лечения или неэффективностью терапии (MDR). Меры предосторожности: риск миелосупрессии, нейропатий, удлинение интервала QT, лактацидоз	J04AK08
170	Пиразинамид [r]	Pyrazinamidum	Меры предосторожности: гиперурекемия, гепатотоксичность, фотосенсебилизация	J04AK01
171	Рифабутин [r]	Rifabutinum	*Используется только у ВИЧ-пациентов, получающих ингибиторы протеазы	J04AB04
172	Рифампицин [r]	Rifampicinum	Меры предосторожности: гепатотоксичность, нарушение зрения, нейротоксичность	J04AB02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
173	Рифапентин [r]	Rifapentinum	Меры предосторожности: гепатотоксичность	J04AB05
174	Стрептомицин [c] [r]	Streptomycinum	Меры предосторожности: ототоксичность, нейротоксичность, нефротоксичность, нервно-мышечная блокада	J01GA01
Глава 18. Противогрибковые лекарственные средства				
175	Амфотерицин B ±	Amphotericinum B	Меры предосторожности: необходимо контролировать уровень электролитов в сыворотке крови (калия и магния) и проводить общий анализ крови	J02AA01
176	Клотримазол	Clotrimazolum	Меры предосторожности: мониторинг аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ)	G01AF02
177	Флуконазол	Fluconazolum	Меры предосторожности: гепатотоксичность, удлинение интервала QT	J02AC01
178	Гризеофульвин	Griseofulvinum	[c] *Противопоказан беременным женщинам. Меры предосторожности: фотосенсебилизация	D01BA01
179	Флуцитозин	Flucytosinum	Меры предосторожности: анемия, лейкопения, панцитопения, тромбоцитопения, эозинофилия, агранулоцитоз и апластическая анемия	J02AX01
180	Итраконазол*	Itraconazolum	*Для лечения хронического аспергиллеза легких, гистоплазмоза, споротрихоза, паракокцидиодомикоза, микозов, вызванных T. marneffei и хромобластомикоза, а также для профилактики гистоплазмоза и инфекций, вызванных T. marneffei, у больных СПИДом	J02AC02
181	Нистатин	Nystatinum	*Проникает в грудное молоко	G01AA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
182	Вориконазол*	Voriconazolum	*Для лечения хронического аспергиллеза легких и острого инвазивного аспергиллеза. *Противопоказан к применению у беременных женщин в связи с тератогенным действием. Меры предосторожности: гепатотоксичность, нарушения зрения (аномальное зрение, нечеткое зрение, изменение цветового зрения, светобоязнь)	J02AC03
Альтернативные лекарственные средства				
183	Микофунгин □	Micafunginum	Меры предосторожности: гепатотоксичность, нефротоксичность, возможны симптомы, вызванные действием гистамина (например, сыпь, зуд, отек лица, расширение сосудов). Быстрое внутривенное введение может увеличить риск реакций, опосредованных гистамином	J02AX05
Глава 19. Противовирусные лекарственные средства				
§ 1. Противогерпетические лекарственные средства				
184	Ацикловир □	Aciclovirum	Меры предосторожности: нефротоксичность, развитие тромбоцитопенической пурпуры/гемолитического уремического синдрома у пациентов с ослабленным иммунитетом, нейротоксичность	J05AB01
Альтернативные лекарственные средства				
185	Валацикловир	Valacyclovirum	*Проникает в грудное молоко. Меры предосторожности: тромботическая тромбоцитопеническая пурпура/гемолитический уремический синдром (иногда со смертельным исходом) наблюдались у пациентов с запущенной ВИЧ-инфекцией, а также у реципиентов аллогенной трансплантации костного мозга или почек, получающих высокие дозы (8 г в сутки)	J05AB11

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
§ 2. Антиретровирусные лекарственные средства				
Нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы				
186	Тенофовира дизопроксил фумарат	Tenofovirum disoproxil fumaratis	Меры предосторожности: развитие лактацидоза, нефротоксичность	J05AF07
187	Абакавир	Abacavirum	*Реакции гиперчувствительности, сопровождающиеся полиорганной недостаточностью Противопоказан пациентам с положительным результатом теста на HLA-B*5701, а также пациентам с предшествующей гиперчувствительностью к абакавиру	J05AF06
188	Ламивудин	Lamivudinum	[c] *Тяжелые острые обострения вирусного гепатита В после прекращения приема ламивудина у ВИЧ-инфицированных пациентов с коинфекцией вирусным гепатитом В	J05AF05
189	Зидовудин	Zidovudinum	Меры предосторожности: гематологическая токсичность, миопатия, лактацидоз, гепатомегалия	J05AF01
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы				
190	Эфавиренз	Efavirenzum	Меры предосторожности: удлинение интервала QT, депрессия, агрессивное поведение, и другие психиатрические симптомы, гепатотоксичность, повышение холестерина и триглицеридов	J05AG03
191	Невирапин [a]	Nevirapinum	Меры предосторожности: гепатотоксичность. [a] – старше 6 недель	J05AG01
Ингибиторы протеаз				
192	Лопинавир + ритонавир	Lopinavirum + ritonavirum	[c] *Ингибирует CYP3A Меры предосторожности: гепатотоксичность, панкреатит, гипергликемия, удлинение интервала QT, повышение холестерина и триглицеридов	J05AR10

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
193	Ритонавир	Ritonavirum	*Требуется проверка возможных межлекарственных взаимодействий: одновременное применение ритонавира с отдельными лекарственными средствами, включая седативные и снотворные, антиаритмические препараты и алкалоиды спорыньи, может приводить к серьезным, в том числе угрожающим жизни, нежелательным реакциям вследствие влияния ритонавира на их метаболизм	J05AE03
194	Даруновир [a]	Darunavirum	[a] – старше 3 лет	J05AE10
195	Атазанавир + ритонавир	Atazanavirum + ritonavir	*Для лечения ВИЧ-1-инфицированных взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев и старше в комбинации с другими антиретровирусными препаратами	J05AR23
Ингибиторы интегразы				
196	Долутегравир [a]	Dolutegravirum	[a] – для диспергируемых таблеток: применяется у детей в возрасте 4 недель и старше с массой тела 3 кг и более [a] – для таблеток 50 мг: применяется у пациентов с массой тела 25 кг и более	J05AJ03
197	Ралтегравир*	Raltegravirum	*Для применения у детей и беременных женщин в схемах лечения второй линии в соответствии с рекомендациями ВОЗ	J05AJ01
Фиксированные комбинации антиретровирусных препаратов				
198	Абакавир + ламивудин	Abacavirum + lamvudinum	Меры предосторожности: пациенты, являющиеся носителями аллеля HLA-B*5701, подвержены более высокому риску развития реакции гиперчувствительности на абакавир, гепатотоксичность	J05AR02
199	Абакавир + долутегравир + ламивудин [c]	Abacavir + lamivudinum + dolutegravirum	*Применение в схемах лечения детей	J05AR13
200	Эфавиренц + эмтрицитабин* □ + тенофовир	Efavirenzum + emtricitabinum + tenofovirum	*Альтернативой для эмтрицитабина может быть ламивудин	J05AR06

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
201	Эмтрицитабин* □ + тенофовир	Emtricitabinum + tenofovirum	*Альтернативой для эмтрицитабина может быть ламивудин	J05AR03
202	Ламивудин + зидовудин	Lamivudinum + zidovudinum	[с] Меры предосторожности: гематологическая токсичность, миопатия, лактацидоз, гепатомегалия, стеатоз	J05AR01
203	Долутегравир + ламивудин + тенофовир	Dolutegravirum + lamivudine + tenofovir		J05AR27
204	Эфавиренц + ламивудин + тенофовир	Efavirenzum + lamivudine + tenofovir		J05AR11
Лекарственные средства для профилактики оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных				
205	Изониазид + пиридоксин + сульфаметоксазол + триметоприм	Isoniazide + pyridoxine + sulfamethoxazole + trimetoprim		J04AM08
§ 3. Прочие противовирусные лекарственные средства				
206	Валганцикловир □ [с]	Valganciclovirum	*Для лечения цитомегаловирусного ретинита (CMV_r)	J05AB14
§ 4. Лекарственные средства против вирусных гепатитов				
Лекарственные средства для лечения вирусного гепатита В – нуклеозидные/нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы				
207	Энтекавир	Entecavirum	Меры предосторожности: гепатотоксичность, лактацидоз	J05AF10
208	Тенофовира дизопроксил фумарат	Tenofovirum disoproxil fumaratis	*Прекращение противовирусной терапии против вируса гепатита В, включая прием таблеток тенофовира дизопроксилфумарата, может быть связано с тяжелыми острыми обострениями гепатита. Меры предосторожности: развитие лактацидоза, нефротоксичность	J05AF07

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
209	Тенофовира алафенамид	Tenofoviri alafenamidum	*Рекомендуется в клиническом руководстве по вирусному гепатиту В. Меры предосторожности: прекращение лечения вирусного гепатита В, включая тенофовир алафенамида фумарат, может привести к тяжелым острым обострениям вирусного гепатита В	J05AF13
Средства для лечения вирусного гепатита D				
210	Пегилированный интерферон альфа (2a или 2b)	Pegylated interferon alfa (2a or 2b)	*Рекомендуется при лечении вирусного гепатита D	L03AB10 L03AB11 L03AB13
Лекарственные средства для лечения вирусного гепатита С – комбинации пангенетических противовирусных средств прямого действия				
211	Даклатасвир*	Daclatasvirum	*Пангенотипический при применении в комбинации с софосбувиром	J05AP07
212	Глекапревир + пибрентасвир	Glecaprevirum + pibrentasvir	Меры предосторожности: риск реактивации вируса гепатита В у пациентов с коинфекцией вирусами гепатитов С и В	J05AP57
213	Равидасвир*	Ravidasvirum	*Пангенотипический при применении в комбинации с софосбувиром	J05AP13
214	Софосбувир*	Sofosbuvirum	*Пангенотипический при применении в комбинации с даклатасвиром или равидасвиром	J05AP08
215	Софосбувир + велпатасвир	Sofosbuvirum + velpatasvirum	[c] Меры предосторожности: риск реактивации вируса гепатита В у пациентов с коинфекцией вирусами гепатитов С и В	J05AP55
Лекарственные средства для лечения вирусного гепатита С – комбинации непангенетических противовирусных средств				
216	Ледипасвир + софосбувир	Ledipasvirum + sofosbuvirum	Меры предосторожности: риск реактивации вируса гепатита В у пациентов с коинфекцией вирусами гепатитов С и В	J05AP51
Лекарственные средства для лечения вирусного гепатита С – другие противовирусные средства				
217	Рибавирин	Ribavirinum	*Для лечения вирусного гепатита С в комбинации с противовирусными средствами прямого действия	J05AP01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Глава 20. Противопротозойные лекарственные средства				
§ 1. Противолямблиозные лекарственные средства				
218	Метронидазол* □	Metronidazolum	*Противопоказан в I триместре беременности. Меры предосторожности: вызывает дисульфирамоподобную реакцию на алкоголь (например, судороги, тошнота, рвота, головная боль, покраснение лица)	P01AB01
219	Тинидазол*	Tinidazolum	*Препарат выбора, указан в клиническом руководстве. **Противопоказан в I триместре беременности и во время лактации	P01AB02
§ 2. Противопневмоцитные и противотоксоплазмозные лекарственные средства				
220	Сульфаметоксазол + триметоприм [r]	Sulfamethoxazolum + thrimethoprimum	Меры предосторожности: апластическая анемия, агранулоцитоз, гепатотоксичность, гиперкалиемия, гипогликемия, гипонатриемия, тромбоцитопения	J01EE01
221	Сульфадиазин	Sulfadiazinum	*Противопоказан детям младше 2 месяцев, беременным женщинам, лактирующим женщинам. Меры предосторожности: нефротоксичность (кристаллурия, гематурия, олигоурия)	J01EC02
§ 3. Лекарственные средства по профилактики для путешественников				
222	Хлорохин	Chloroquinum	*Используется для профилактики инфекции, вызванной Plasmodium vivax	P01BA01
223	Доксициклин [a]	Doxycyclinum	[a] – старше 8 лет	J01AA02
Раздел 7. Иммуномодуляторы и противоопухолевые лекарственные средства				
Глава 21. Иммуномодуляторы при неонкологических заболеваниях				
224	Адалимумаб* □ ±	Adalimumabum	*Применяется при ревматоидном артрите, псориазе, болезни Крона, увеите. *Включая биосимиляры	L04AB04

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
			Меры предосторожности: риски злокачественных новообразований (лимфомы и гепатоспленическая Т-клеточная лимфома), повышенный риск серьезных инфекций	
225	Азатиоприн ±	Azathioprinum	[с] *Применяется при аллотрансплантации почек, болезни Крона, ревматоидном артрите. Меры предосторожности: внутрипеченочный холестаз при беременности, иммуносупрессия, риски злокачественных новообразований	L04AX01
226	Циклоспорин	Ciclosporinum	*Применяется при аллотрансплантации органов, болезни Крона, псориазе, ревматоидном артрите. Меры предосторожности: иммуносупрессия, гипертония, нефротоксичность	L04AD01
227	Такролимус	Tacrolimusum	*Профилактика отторжения органов при трансплантации, болезнь Крона. Меры предосторожности: риск злокачественных новообразований, повышенная восприимчивость к инфекциям	L04AD02
228	Микофеноловая кислота	Acidum mycophenolicum	*Профилактика отторжения органов при трансплантации почек. Меры предосторожности: риск эмбриофетальной токсичности, фетотоксичности, злокачественных новообразований	L04AA06
229	Микофенолата мофетил	Mycophenolatis mofetilum	*Профилактика отторжения органов при трансплантации почек. Меры предосторожности: риск эмбриофетальной токсичности, фетотоксичности, злокачественных новообразований	L04AA06
Глава 22. Противоопухолевые и поддерживающие лекарственные средства				
§ 1. Цитотоксические средства				
230	Арсения триоксид* ±	Arsenicum trioxide	*Острый промиелоцитарный лейкоз	L01XX27
231	Аспарагиназа*	Asparaginasum	*Острый лимфобластный лейкоз	L01XX02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
232	Блеомицин*	Bleomycinum	*Лимфома Ходжкина, саркома Капоши, герминогенная опухоль яичника, герминогенная опухоль яичек	L01DC01
233	Кальция фолинат*	Calcii folinas	*Лимфома Беркитта, ранние стадии рака толстой кишки, ранние стадии рака прямой кишки, гестационная трофобластическая неоплазия, метастатический колоректальный рак, остеосаркома	V03AF03
234	Бендамустин*	Bendamustinum	*Хронический лимфолейкоз, фолликулярная лимфома	L01AA09
235	Капецитабин*	Capecitabinum	*Ранние стадии рака толстой кишки, ранние стадии рака прямой кишки, метастатический рак молочной железы, метастатический колоректальный рак	L01BC06
236	Карбоплатин* ±	Carboplatinum	*Рак шейки матки, ранние стадии рака молочной железы, эпителиальный рак яичника, рак головы/шеи, низкодифференцированная глиома, рак носоглотки, нефробластома (опухоль Вильмса), немелкоклеточный рак легких, остеосаркома, ретинобластома, герминогенная опухоль яичек и яичников	L01XA02
237	Хлорамбуцил*	Chlorambucilum	*Хроническая лимфоцитарная лейкемия	L01AA02
238	Цисплатин*	Cisplatinum	*Рак шейки матки, рак головы и шеи, рак носоглотки, низкодифференциорованная глиома, немелкоклеточный рак легкого, остеосаркома, герминогенная опухоль яичника, герминогенная опухоль яичек	L01XA01
239	Циклофосфамид*	Cyclophosphamidum	*Острый лимфобластный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома Буркитта, хронический лимфоцитарный лейкоз, диффузная В-крупноклеточная лимфома, ранние стадии рака молочной железы, гестационная трофобластическая неоплазия, саркома Юинга, лимфома Ходжкина, фолликулярная лимфома, низкодифференциорованная глиома, рабдомиосаркома, метастатический рак молочной железы, мультиформная миелома, нефробластома (опухоль Вильмса)	L01AA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
240	Цитарабин*	Cytarabinum	*Острый миелобластный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз, промиелолейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, гистиоцитоз клеток Лангерганса	L01BC01
241	Дакарбазин*	Dacarbazinum	*Лимфома Ходжкина	L01AX04
242	Дактиномицин*	Dactinomycinum	*Саркома Юинга, гестационная трофобластическая неоплазия, рабдомиосаркома, нефробластома (опухоль Вильмса)	L01DA01
243	Даунорубицин*	Daunorubicinum	*Острый миелобластный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз, острый промиелолейкоз	L01DB02
244	Доцетаксел* ±	Docetaxelum	*Ранние стадии рака молочной железы, метастатический рак молочной железы, метастатический рак предстательной железы	L01CD02
245	Доксорубицин*	Doxorubicinum	*Острый лимфобластный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Беркитта, диффузная В-крупноклеточная лимфома, ранние стадии рака молочной железы, лимфома Ходжкина, саркома Капоши, фолликулярная лимфома, метастатический рак молочной железы, остеосаркома, саркома Юинга, опухоль Вильмса, мультиформная миелома	L01DB01
246	Доксорубицин (пегилированный липосомальный) ±	Doxorubicinum (pegylated liposomal)	*Саркома Капоши	L01DB01
247	Этопозид*	Etoposidum	*Острый лимфобластный лейкоз, острый миелоидный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, герминогенная опухоль яичек, гестационная трофобластическая неоплазия, лимфома Ходжкина, немелкоклеточный рак легкого, герминогенная опухоль яичников, ретинобластома, саркома Юинга, лимфома Беркитта, опухоль Вильмса, остеосаркома	L01CB01
248	Флударабин*	Fludarabinum	*Хронический лимфолейкоз	L01BB05

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
249	Флуороурацил*	Fluorouracilum	*Ранние стадии рака молочной железы, ранние стадии рака толстой кишки, ранние стадии рака прямой кишки, метастатический колоректальный рак, рак носоглотки	L01BC02
250	Гемцитабин*	Gemcitabinum	*Эпителиальный рак яичников, немелкоклеточный рак легкого	L01BC05
251	Гидроксикарбамид*	Hydroxycarbamidum	*Хронический миелоидный лейкоз	L01XX05
252	Ифосфамид*	Ifosfamidum	*Апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Буркитта, опухоль Вильмса, герминогенная опухоль яичников, герминогенная опухоль яичек, остеосаркома, рабдомиосаркома, саркома Юинга	L01AA06
253	Иринотекан*	Irinotecanum	*Метастатический колоректальный рак, нефробластома (опухоль Вильмса), рабдомиосаркома	L01CE02
254	Мелфалан*	Melphalanum	*Множественная миелома	L01AA03
255	Меркаптопурин*	Mercaptopurinum	*Острый лимфобластный лейкоз, острый промиелолейкоз, гистиоцитоз клеток Лангерганса	L01BB02
256	Метотрексат*	Methotrexatum	*Ранние стадии рака молочной железы, гестационная трофобластическая неоплазия, остеосаркома, острый лимфобластный лейкоз, острый промиелолейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Буркитта, гистиоцитоз клеток Лангерганса	L01BA01
257	Оксалиплатин*	Oxaliplatinum	*Рак толстой кишки на ранней стадии, метастатический колоректальный рак	L01XA03
258	Паклитаксел*	Paclitaxelum	*Рак шейки матки, эпителиальный рак яичников, рак молочной железы на ранней стадии, метастатический рак молочной железы, саркома Капоши, рак носоглотки, немелкоклеточный рак легкого, герминогенная опухоль яичника	L01CD01
259	Пегаспаргаза* ±	Pegaspargasum	*Острый лимфобластный лейкоз	L01XX24
260	Прокарбазин* [с]	Procarbazinum	*Лимфома Ходжкина	L01XB01
261	Тиогуанин* [с]	Tioguaninum	*Острый лимфобластный лейкоз	L01BB03
262	Винбластин*	Vinblastinum	*Апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Ходжкина, саркома Капоши, гистиоцитоз клеток Лангерганса,	L01CA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
			низкодифференцированная глиома, герминогенная опухоль яичка, герминогенная опухоль яичников	
263	Винкристин	Vincristinum	*Диффузная В-крупноклеточная лимфома, гестационная трофобластическая неоплазия, лимфома Ходжкина, саркома Капоши, фолликулярная лимфома, ретинобластома, рабдомиосаркома, саркома Юинга, острый лимфобластный лейкоз, опухоль Вильмса, лимфома Беркитта, гистиоцитоз клеток Лангерганса, низкодифференцированная глиома	L01CA02
264	Винорелбин	Vinorelbinum	*Немелкоклеточный рак легких, метастатический рак молочной железы, рабдомиосаркома	L01CA04
Альтернативные лекарственные средства				
265	Митоксантрон	Mitoxantronum	*Применяется при остром миелоидном лейкозе у взрослых. Препарат выбора для индукционной химиотерапии острого миелоидного лейкоза	L01DB07
266	Ломустин	Lomustinum	*Вызывает миелосупрессию (тромбоцитопению, лейкопению), приводящую к летальному исходу, применяется 1 раз в 6 недель	L01AD02
§ 2. Таргетная терапия				
Альтернативные лекарственные средства				
267	Полностью трансретиноидная кислота (ATRA)* ±	All-transretinoid acid (ATRA)	*Острый промиелоцитарный лейкоз	L01XF01
268	Бортезомиб*	Bortezomibum	*Мультиформная миелома	L01XG01
269	Дазатиниб*	Dasatinibum	*Иматиниб-резистентный хронический миелоидный лейкоз	L01EA02
270	Эрлотиниб* □	Erlotinibum	*Мутация EGFR-положительный прогрессирующий немелкоклеточный рак легкого	L01EB02
271	Эверолимус*	Everolimusum	*Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома	L01EG02
272	Ибрутиниб*	Ibrutinibum	*Рецидивирующий/рефрактерный хронический лимфолейкоз	L01EL01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
273	Иматиниб*	Imatinibum	*Хронический миелоидный лейкоз, стромальная опухоль желудочно-кишечного тракта, острый лимфобластный лейкоз с положительной филадельфийской хромосомой	L01EA01
274	Нилотиниб*	Nilotinibum	*Иматиниб-резистентный хронический миелоидный лейкоз	L01EA03
275	Ритуксимаб* ±	Rituximabum	*Лимфома Беркитта, диффузная В-крупноклеточная лимфома, хронический лимфолейкоз, фолликулярная лимфома	L01FA01
276	Трастузумаб* ±	Trastuzumabum	*Ранняя стадия HER2(+) рака молочной железы, метастатический HER2(+) рак молочной железы	L01FD01
277	Блинатумомаб* ±	Blinatumomabum	*В-клеточный острый лимфобластный лейкоз	L01FX07
278	Филграстим*	Filgrastim	*Первичная профилактика у пациентов с высоким риском развития фебрильной нейтропении, связанной с миелотоксической химиотерапией, вторичная профилактика для пациентов, у которых развилась нейтропения после предшествующей миелотоксической химиотерапии, для облегчения введения схем химиотерапии с высокой дозировкой	L03AA02
279	Леналидомид*	Lenalidomidum	*Мультиформная миелома	L04AX04
280	Пегфилграстим*	Pegfilgrastim	*Первичная профилактика у пациентов с высоким риском развития фебрильной нейтропении, связанной с миелотоксической химиотерапией, вторичная профилактика для пациентов, у которых развилась нейтропения после предшествующей миелотоксической химиотерапии, для облегчения введения схем химиотерапии с высокой дозировкой	L03AA13
281	Пембролизумаб* □ ±	Pembrolizumabum	*Метастатический рак шейки матки с экспрессией PD-L1 на уровне 1 % и более в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины. *Метастатический рак толстого кишечника – в качестве монотерапии при опухолях с недостаточным восстановлением (dMMR)/высокой нестабильностью микросателлитов (MSI-H)	L01FF02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
			*Метастатический немелкоклеточный рак легкого с экспрессией PD-L1 на уровне 50 % и более, при отсутствии онкогенных драйверных мутаций – в качестве монотерапии. *Метастатическая меланома – в качестве монотерапии	
282	Бевацизумаб ±	Bevacizumabum	*Применяется при метастатическом раке anti-VGEF. *Метастатический колоректальный рак: в комбинации с химиотерапией на основе производных фторпиримидина. *Местно-рецидивирующий или метастатический рак молочной железы: в качестве первой линии терапии в комбинации с паклитакселом. *Распространенный неоперабельный, метастатический или рецидивирующий неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого: в качестве первой линии терапии дополнительно к химиотерапии на основе препаратов платины. *Распространенный и (или) метастатический почечно-клеточный рак: в качестве первой линии терапии в комбинации с интерфероном альфа-2а	L01FG01
283	Афатиниб* ±	Afatinibum	*Альтернатива эрлотинибу	L01EB03
284	Гефитиниб* ±	Gefitinibum	*Альтернатива эрлотинибу	L01EB01
285	Атезолизумаб* ±	Atezolizumabum	*Альтернатива пембролизумабу	L01FF05
286	Ниволумаб* ±	Nivolumabum	*Альтернатива пембролизумабу	L01FF01
287	Трастузумаб эмтанзин* ±	Trastuzumabi emtansinum	*Лечение метастатического рака молочной железы	L01FD03
288	Пертузумаб* ±	Pertuzumabum	*Адъювантная и неоадъювантная терапия рака молочной железы	L01FD02
289	Осимертиниб ±	Osimertinibum	*Применяется при немелкоклеточном раке легкого	L01EB04
290	Рибоциклиб ±	Ribociclibum	*При метастатическом раке молочной железы HER2(–)	L01EF02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
291	Палбоциклиб ±	Palbociclibum	*Для начального лечения гормон-рецептор-позитивного, HER2(–) негативного, запущенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы	L01EF01
§ 3. Гормоны и антигормоны				
292	Абиратерон* □	Abirateronum	*Метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы	L02BX03
293	Анастрозол	Anastrozolum	*Ранняя стадия рака молочной железы, метастатический рак молочной железы	L02BG03
294	Бикалутамид*	Bicalutamidum	*Метастатический рак предстательной железы	L02BB03
295	Дексаметазон*	Dexamethasonum	*Острый лимфобластный лейкоз, апластическая крупноклеточная лимфома, лимфома Буркитта, мультиформная лимфома	H02AB02
296	Гидрокортизон*	Hydrocortisonum	*Острый лимфобластный лейкоз, лимфома Буркитта	H02AB09
297	Лейпрорелин* □ ±	Leiprorelinum	*Ранние стадии рака молочной железы, метастатический рак предстательной железы	L02AE02
298	Метилпреднизолон* [с]	Methylprednisolonum	*Острый лимфобластный лейкоз, лимфома Беркитта	H02AB04
299	Преднизолон* □	Prednisolonum	*Хронический лимфолейкоз, диффузная В-крупноклеточная лимфома, лимфома Ходжкина, фолликулярная лимфома острый лимфобластный лейкоз, лимфома Беркитта, апластическая крупноклеточная лимфома, гистиоцитоз клеток Лангерганса, мультиформная миелома, метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы	H02AB06
300	Тамоксифен*	Tamoxifenum	*Ранние стадии рака молочной железы, метастатический рак молочной железы	L02BA01
Альтернативные лекарственные средства				
301	Флутамид*	Flutamidum	*Альтернатива бикалутамиду	L02BB01
302	Госерелин	Goserelinum	*Альтернатива лейпрорелину	L02AE03

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
§ 4. Поддерживающее лечение				
303	Аллопуринол* [с]	Allopurinolum	*Синдром лизиса опухоли	M04AA01
304	Месна*	Mesna	*Герминогенная опухоль яичка, герминогенная опухоль яичников, остеосаркома, рабдомиосаркома, саркома Юинга, лимфома Буркитта, нефробластома (опухоль Вильмса)	V03AF01
305	Расбуриказа* ±	Rasburicasum	*Синдром лизиса опухоли	V03AF07
306	Золендроновая кислота	Zoledronic acid	*Метастатические болезни костей	M05BA08
Раздел 8. Лечебное питание				
307	Аминокислоты, жировые (липидные) эмульсии*	Aminoacids, fat emulsions	*Для парентерального питания	B05BA01 B05BA02
Раздел 9. Лекарственные средства, влияющие на систему крови				
Глава 23. Противоанемические средства				
308	Препараты железа*	Ferrous salt	[с]	B03AA01 B03AA02 B03AA03 B03AA04 B03AA05 B03AA06 B03AA07 B03AA08 B03AA09 B03AA10 B03AA11 B03AA12 B03AB01 B03AB02 B03AB03

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
				B03AB04 B03AB05 B03AB07 B03AB08 B03AB09 B03AB10
309	Препараты железа + фолиевая кислота	Ferrous salt + folic acidum		B03AD01 B03AD02 B03AD03 B03AD04 B03AD05
310	Фолиевая кислота*	Folic acidum	□ Предзачаточное применение для профилактики дефектов нервной трубки, женщинам репродуктивного возраста с железодефицитной анемией назначается в дозе 0,4 мг ежедневно в течение 3 месяцев	B03BB01
311	Цианокобаламин*	Cyanocobalaminum	*При мегалобластной анемии, послеоперационная анемия, дефицит фактора Касла	B03BA01
312	Стимуляторы эритропоэза: эритропоэтин альфа, бета, зета; дарбепоэтин альфа; метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета	Erythropoiesis-stimulating agents	*Включая биосимиляры	B03XA01 B03XA02 B03XA03
Глава 24. Лекарственные средства, влияющие на коагуляцию				
313	Ривароксабан	Rivaroxabanum	*Альтернатива дабигатрану. Меры предосторожности: потенциально нецелесообразное использование у пожилых людей старше 65 лет для длительного лечения неклапанной фибрилляции предсердий или венозной тромбоэмболии (ВТЭ)	B01AF01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
314	Эноксапарин □	Enoxaparine sodium	*Мониторинг уровня анти-фактора Ха среди групп высокого риска (беременные пациентки, пациенты с почечной недостаточностью, ожирением), а также в случае возникновения отклонений в показателях свертываемости крови или кровотечений во время лечения	B01AB05
315	Гепарина натрий	Heparin sodium	*Мониторинг активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в ходе лечения с поддержанием его значений в 2,5–3 раза выше контрольных	B01AB01
316	Фитоменадион	Phytomenadionum	[с] *Контроль международного нормализованного отношения (МНО)	B02BA01
317	Протамина сульфат	Protamini sulfas	*Не следует применять при кровотечениях, возникших без предварительного воздействия гепарина. Меры предосторожности: тяжелая гипотензия, сердечно-сосудистый коллапс, некардиогенный отек легких, катастрофическая легочная вазоконстрикция и легочная гипертензия при быстрой внутривенной инъекции, высоких дозах, повторных дозах или предшествующем воздействии протамина или протаминсодержащих препаратов (например, инсулина)	V03AB14
318	Транексамовая кислота	Acidum tranexamicum	Меры предосторожности: если лечение внутривенным введением транексамовой кислоты планируется на срок более 3 месяцев, следует рассмотреть возможность регулярного офтальмологического мониторинга (например, остроты зрения и оптической когерентной томографии)	B02AA02
319	Варфарин □	Warfarinum	*Контроль МНО	B01AA03
320	Десмопрессин [с]	Desmopressinum	Меры предосторожности: риск гипонатриемии, противопоказан пациентам с повышенным риском развития тяжелой гипонатриемии (например, пациентам с чрезмерным потреблением жидкости, заболеваниями, которые могут вызывать нарушения водно-	H01BA02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
			электролитного баланса, а также тем, кто принимает петлевые диуретики или системные/ингаляционные глюкокортикоиды)	
Альтернативные лекарственные средства				
321	Дабигатран* □	Dabigatranum	*Альтернатива ривароксабану. *При применении у детей для лечения и вторичной профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ) дозировку следует определять по массе тела. Меры предосторожности: перед началом терапии дабигатраном необходимо оценить функцию почек у всех пациентов	B01AE07
322	Апиксабан	Apixabanum	*Альтернатива дабигатрану. **Для определения дозировки у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий необходимо измерить массу тела и уровень креатинина в сыворотке крови. Меры предосторожности: перед началом терапии дабигатраном необходимо оценить функцию почек у всех пациентов	B01AF02
Глава 25. Другие лекарственные средства для лечения гемоглобинопатий				
323	Деферасирокс	Deferasiroxum	Меры предосторожности: может вызывать острое поражение почек, включая острую почечную недостаточность, требующую диализа, и токсическое поражение почечных канальцев, в том числе синдром Фанкони	V03AC03
324	Дефероксамин	Deferoxaminum	*Вспомогательная терапия при остром отравлении препаратами железа	V03AC01
325	Гидроксикарбамид	Hydroxycarbamidum	[c] *При эритремии, при беременности категория D	L01XX05
Раздел 10. Продукты крови человеческого происхождения и плазмозаменители				
Глава 26. Кровь и компоненты крови				
326	Криопреципитат	Cryopraecipitatum		B05AX

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
327	Свежезамороженная плазма	Fresh-frozen plasma		B05AX03
328	Тромбоцитарная масса	Massa trombocitarum		B05AX02
329	Эритроцитарная масса	Massa erythrocitarum		B05AX01
330	Лейкоцитарная масса	Massa leucocytaris		B05AX
Глава 27. Человеческие иммуноглобулины				
331	Anti-D иммуноглобулин ±	Anti-D immunoglobulin	Меры предосторожности: риски внутрисосудистого гемолиза, внутричерепное кровоизлияние (наблюдение в организации здравоохранения в течение как минимум 8 часов после введения препарата при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре)	J06BB01
332	Антирабический иммуноглобулин	Anti-rabies immunoglobulin	*Содержит антитела к антигену бешенства и используется для обеспечения временного пассивного иммунитета к вирусу бешенства. **Для постконтактной профилактики	J06BB05
333	Противостолбнячный иммуноглобулин	Anti-tetanus immunoglobulin	*Содержит противостолбнячный антитоксин и используется для обеспечения временного пассивного иммунитета к столбняку	J06BB02
334	Нормальный человеческий иммуноглобулин*	Human normal immunoglobulin	*Первичный иммунодефицит, болезнь Кавасаки, гистиоцитоз клеток Лангерганса	J06BA01 J06BA02
335	Иммуноглобулин человеческий против гепатита В (anti HBV) ±	Hepatitis B immunoglobulin	*Для профилактики вертикальной передачи вирусного гепатита В у новорожденных, рожденных от матерей с вирусным гепатитов В (в течение первых 12 часов после рождения)	J06BB04
Глава 28. Факторы коагуляции крови				
336	Фактор свертывания VIII (полученный из плазмы)	Factor coagulationis VIII	*Профилактика и лечение кровотечений при гемофилии А, приобретенной недостаточности фактора свертывания крови VIII	B02BD02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
337	Фактор свертывания IX (полученный из плазмы)	Factor coagulationis IX	*Профилактика и лечение кровотечений при гемофилии В, приобретенной недостаточности фактора свертывания IX	B02BD04
338	Фактор свертывания VIII (рекомбинантный) ±	Factor coagulationis VIII, recombinant	* Профилактика и лечение кровотечений при гемофилии А (врожденный дефицит фактора VIII)	B02BD02
339	Фактор свертывания IX (рекомбинантный) ±	Factor coagulationis IX, recombinant	* Профилактика и лечение кровотечений при гемофилии В (врожденный дефицит фактора IX)	B02BD04
340	Фактор свертывания VIIa / эптаког альфа (активированный) ±	Coagulation factor VIIa / eptacog alfa (activated)	*Кровотечения и профилактика массивных кровотечений при хирургических операциях у больных с наследственной или приобретенной гемофилией с ингибиторами к фактору свертывания VIII и фактору свертывания IX, наследственный дефицит фактора VII, у пациентов с тромбастенией Гланцмана и рефрактерностью (в настоящем или прошлом) к трансфузиям тромбоцитарной массы при наличии или отсутствии антител к тромбоцитам или при недоступности тромбоцитарной массы	B02BD08
Глава 29. Плазмозамещающие лекарственные средства				
341	Декстран 70 □	Dextranum	Меры предосторожности: по 70 % на 0,9 % NaCl – не следует принимать при тяжелом заболевании почек, тяжелой застойной сердечной недостаточности или неконтролируемом кровотечении	B05AA05
Раздел 11. Сердечно-сосудистые лекарственные средства				
342	Бисопролол □	Bisoprololum	Меры предосторожности: при прекращении длительной терапии следует постепенно снижать дозировку в течение примерно 1–2 недель, регулярно (например, ежемесячно) контролировать артериальное давление и корректировать дозировку пока артериальное давление не будет под контролем	C07AB07
343	Глицерилтринитрат	Glycerylum trinitrate		C01DA02
344	Изосорбид динитрат	Isosorbidum dinitrate		C01DA08

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
345	Верапамил	Verapamilum		C08DA01
346	Дигоксин	Digoxinum		C01AA05
347	Эпинефрин*	Epinephrinum		C01CA03
348	Лидокаин	Lidocainum		C01BB01
349	Верапамил	Verapamilum		C08DA01
350	Амиодарон	Amiodaronum		C01BD01
351	Прокаинамид*	Procainamidum	*Указан в клиническом руководстве по аритмиям	C01BA02
352	Амлодипин □	Amlodipinum		C08CA01
353	Эналаприл □	Enalaprilum		C09AA02
354	Лизиноприл □	Lisinoprilum	*Альтернатива: ингибиторы АПФ	C09AA03
355	Каптоприл □	Captoprilum	□ Применяется в качестве неотложной помощи при гипертоническом кризе	C09AA01
356	Гидрохлортиазид* □	Hydrochlorthiazidum		C03AA03
357	Лозартан □	Losartanum	Указан в клиническом руководстве по гипертонической болезни, назначается при противопоказаниях к ингибиторам АПФ	C09CA01
358	Лизиноприл □ + амлодипин □	Lisinopril + amlodipinum	*Альтернатива: ингибиторы АПФ – для лизиноприла, дигидропиридины – для амлодипина	C09BB03
359	Телмисартан □ + амлодипин □	Telmisartan + amlodipinum	*Альтернатива: блокаторы ангиотензина II – для телмисартана, дигидропиридины – для амлодипина	C09DB04
360	Телмисартан □ + гидрохлортиазид □	Telmisartan + hydrochlorothiazidum	*Альтернатива: блокаторы ангиотензина II – для телмисартана, хлорталидон, хлортиазид, индапамид – для гидрохлортиазида	C09DA07
361	Амлодипин + кандесартан	Amlodipine + candesartanum	*Всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендуется стартовая комбинированная антигипертензивная терапия, кроме лиц низкого сердечно-сосудистого риска с артериальным давлением менее 150/90 мм рт. ст., лиц в возрасте 80 лет и старше и лиц с синдромом старческой астении	C09DB07
362	Фуросемид* □	Furosemidum		C03CA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
363	Спиронолактон	Spironolactonum		C03DA01
Альтернативные лекарственные средства				
364	Небивалол	Nebivalolum	*Альтернатива: бета-блокаторы	C07AB12
365	Карведилол	Carvedilolum	*Альтернатива: бета-блокаторы	C07AG02
366	Флекаинид	Flecainidum	*При пароксизмальных фибрилляциях предсердий, желудочковых аритмиях, противопоказан при перенесенном остром инфаркте миокарда	C01BC04
367	Гидралазин □	Hydralazinum	*Гидралазин применяется только при острых состояниях, связанных с тяжелой артериальной гипертензией у беременных. Применение гидралазина для лечения артериальной гипертензии вне беременности не рекомендуется в связи с наличием более эффективных и безопасных лекарственных средств	C02DB02
368	Метилдопа □	Methyldopa	*Метилдопа применяется только для лечения артериальной гипертензии при беременности. Применение для лечения артериальной гипертензии вне беременности не рекомендуется в связи с наличием более эффективных и безопасных лекарственных средств	C02AB01 C02AB02
369	Рамиприл	Ramiprilum	*Альтернатива эналаприлу и лизиноприлу	C09AA05
370	Индапамид	Indapamidum	*Альтернатива гидрохлортиазиду	C03BA11
371	Кандесартан	Candesartanum	*Альтернатива лозартану	C09CA06
372	Натрия нитропруссид	Natrii nitroprussidum		V03AB08
373	Допамин	Dopaminum		C01CA04
374	Норэпинефрин	Norepinephrinum		C01CA03
375	Добутамин	Dobutaminum		C01CA07
376	Торасемид	Torasemidum	*Альтернатива фуросемиду	C03CA04

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
377	Милринон	Milrinonum	*Альтернатива добутамину, может применяться у пациентов, получающих бета-блокаторы	C01CE02
378	Левосимендан	Levosimendanum	*Альтернатива добутамину	C01CX08
Глава 30. Антитромботические средства				
§ 1. Антиагрегантные средства				
379	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalicylic acidum		B01AC06
380	Клопидогрел	Clopidogrelum		B01AC04
Альтернативные лекарственные средства				
381	Тикагрелор	Ticagrelorum	*Альтернатива клопидогрелу	B01AC24
382	Тирофибан ±	Tirofibanum	*Применяется при проведении чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов высокого риска	B01AC1
§ 2. Тромболитические средства				
383	Стрептокиназа	Streptokinasum		B01AD01
384	Алтеплаза ±	Alteplasum		B01AD02
Глава 31. Липидоснижающие средства				
385	Симвастатин* □	Simvastatinum	*Использовать у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений	C10AA01
Альтернативные лекарственные средства				
386	Аторвастатин	Atorvastatinum	*Альтернатива симвастатину	C10AA05
387	Розувастатин	Rosuvastatinum	*Альтернатива симвастатину	C10AA07
388	Питавастатин	Pitavastatinum	*Альтернатива симвастатину	C10AA08
Раздел 12. Дерматологические лекарственные средства				
Глава 32. Противогрибковые средства				
389	Миконазол □	Miconazolum	*Альтернатива: имидазолы и триазолы, включая комбинации	D01AC02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
390	Тербинафин	Terbinafinum		D01AE15 D01BA02
391	Натрия тиосульфат	Sodium thiosulfatum		V03AB06
Глава 33. Противомикробные средства				
392	Мупироцин	Mupirocinum		D06AX09
393	Перманганат калия	Kalii permanganas		D08AX06
394	Сульфадиазин серебра [a]	Sulfadiazini argentum	[a] □ Рекомендуется назначать с 2 месяцев	D06BA01
395	Бацитрацин + неомицин			D06AX
Глава 34. Противовоспалительные и противозудные средства				
396	Бетаметазон □ [a]	Betamethasonum	[a] – для новорожденных предпочтителен гидрокортизон	D07AC01
397	Гидрокортизон □	Hydrocortisonum		H02AB09 D07AA02
Альтернативные лекарственные средства				
398	Флуоцинолона ацетонид	Fluocinolone acetonidum	*Альтернатива бетаметазону	D07AC04
399	Мометазон	Mometasonum	*Альтернатива бетаметазону	D07AC13
400	Преднизолон	Prednisolonum	*Альтернатива гидрокортизону	D07AA03
Глава 35. Лекарственные средства, влияющие на дифференсацию и пролиферацию				
401	Кальципотриол □	Calcipotrolum		D05AX52
402	Салициловая кислота	Salicylic acidum		D01AE12
Альтернативные лекарственные средства				
403	Метотрексат	Methotrexatum		L04AX03
404	Адалимумаб* ±	Adalimumabum	[c]	L04AB04

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Глава 36. Противочесоточные и противопедикуллезные лекарственные средства				
405	Бензилбензоат □ [a]	Benzylum benzoate	[a] – □ рекомендуется назначать с 2 лет	P03AX01
406	Перметрин	Permethrinum		P03AC04
Раздел 13. Диагностические лекарственные средства				
Глава 37. Офтальмологические средства				
407	Флуоресцин	Fluoresceinum		S01JA01
408	Тропикамид** □	Tropicamidum		S01FA06
Глава 38. Радиоконтрастные средства				
409	Амидотризоат □	Amidotriozoatum		V08AA01
410	Бария сульфат [c]	Barium sulfate		V08BA01 V08BA02
411	Йогексол □	Iohexolum	*В качестве альтернативы могут рассматриваться другие доступные средства	V08AB02
412	Меглумина йотроксат □	Megluminum iotroxate		V08AC02
Альтернативные лекарственные средства				
413	Йодиксанол	Iodixanolum	*Альтерантива йогексола	V08AB09
414	Йопромид	Iopromidum	*Альтерантива йогексола	V08AB05
Раздел 14. Антисептические средства				
415	Хлоргексидин □	Chlorhexidinum		B05CA02 D08AC02 D09AA12
416	Этанол □	Ethanolum		D08AX08
417	Повидон йод □	Povidon iodinum		D08AG02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
Раздел 15. Диуретики				
418	Фуросемид* □	Furosemidum		C03CA01
419	Гидрохлортиазид*	Hydrochlorthiazidum		C03AA03
420	Маннитол [с]	Mannitolum		B05BC01
421	Спиронолактон [с]	Spironolactonum		C03DA01
Альтернативные лекарственные средства				
422	Амилорид	Amiloridum		C03DB01
423	Торасемид	Torasemidum		C03CA04
424	Индапамид	Indapamidum		C03BA11
425	Хлорталидон	Chlortalidonum		C03BA04
426	Эплеренон	Eplerenonum	*При сердечной недостаточности, альтернатива спиронолактону	C03DA04
Раздел 16. Лекарственные средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта				
Глава 39. Противоязвенные лекарственные средства				
427	Омепразол* □	Omeprazolum		A02BC01
428	Фамотидин	Famotidinum		A02BA03
Альтернативные лекарственные средства				
429	Пантопразол	Pantopazolum	*Альтернатива омепразолу	A02BC02
430	Лансопразол	Lansoprazolum	*Альтернатива омепразолу	A02BC03
Глава 40. Противорвотные средства				
431	Дексаметазон	Dexamethasonum		H02AB02
432	Метоклопрамид	Metoclopramidum		A03FA01
433	Ондансетрон □	Ondansetronum		A04AA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Глава 41. Противовоспалительные средства				
434	Сульфасалазин □	Sulfasalazinum		A07EC01
435	Гидрокортизон	Hydrocortisonum		A07EA02
436	Преднизолон	Prednisolonum		A07EA01
Глава 42. Слабительные средства				
437	Сенна □	Sennum	*Альтернатива: бисакодил, лактулоза	A06AB06
438	Бисакодил	Bisacadilum		A06AB02
439	Лактулоза	Lactulosum		A06AD11
Глава 43. Лекарственные средства при диарее				
Пероральные регидратационные средства				
440	Соли для пероральной регидратации	Oral rehydration salts		A07CA
Раздел 17. Лекарственные средства для лечения эндокринных заболеваний				
Глава 44. Гормоны надпочечников и синтетические аналоги				
441	Гидрокортизон	Hydrocortisonum		H02AB09
442	Флудрокортизон	Fludrocortisonum		H02AA02
443	Преднизолон	Prednisolonum	*Альтернатива: преднизон	H02AB06
444	Дефлазокорт	Deflazacortum	*Применяется при лечении болезни Дюшена	H02AB13
Глава 45. Гормоны гипофиза				
445	Соматотропин	Somatropinum	*Применяется при лечении карликовости	H01AC01
Альтернативные лекарственные средства				

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
446	Цетрореликс	Cetrorelixum	*Предотвращение преждевременной овуляции у пациенток при контролируемой стимуляции овуляции для получения яйцеклеток и проведения вспомогательных репродуктивных технологий	H01CC02
Глава 46. Андрогены				
447	Тестостерон	Testosteronum		G03BA03
Глава 47. Прогестины				
448	Медроксипрогестерона ацетат*	Medroxyprogesteronum acetatum		G03AC06 G03DA02
449	Прогестерон	Progesteronum		G03DA04
Альтернативные лекарственные средства				
450	Норэтистерон	Norethisteronum	*Альтернатива медроксипрогестерону	G03DC02
Глава 48. Лекарственные средства для лечения сахарного диабета				
§ 1. Инсулины				
451	Инсулин человеческий среднего действия* □	Insulin human intermediate acting	*Включая биосимиляры	A10AC01
452	Инсулин человеческий короткого действия* □	Insulin human rapid acting	*Включая биосимиляры	A10AB01
Аналоги инсулина длительного действия* □				
453	Инсулин гларгин	Insulin glargine	*Включая биосимиляры	A10AE04
454	Инсулин деглудек	Insulin degludec	*Включая биосимиляры	A10AE06
455	Инсулин детемир	Insulin detemir	*Включая биосимиляры	A10AE05
Аналоги инсулина короткого действия* □				
456	Инсулин аспарт*	Insulin aspart	*Включая биосимиляры	A10AB05
457	Инсулин лиспро*	Insulin lispro	*Включая биосимиляры	A10AB04

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
458	Инсулин глулизин*	Insulin glulisine	*Включая биосимиляры	A10AB06
§ 2. Пероральные гипогликемические лекарственные средства				
459	Эмпаглифлозин* □	Empagliflozinum	*Ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (иSGLT2). **Показан пациентам с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском в комбинации со стандартной терапией сердечно-сосудистых заболеваний	A10BK03
460	Гликлазид □	Gliclazidum	*Производное сульфонилмочевины	A10BB09
461	Метформин	Metforminum	*Группа бигуанидов	A10BA02
462	Десмопрессин*	Desmopressinum	*Применяется при лечении несахарного диабета	H01BA02
Альтернативные лекарственные средства				
463	Дапаглифлозин	Dapagliflozinum	*Альтернатива эмпаглифлозину и SGLT2. **Показан пациентам с сахарным диабетом 2 типа и высоким сердечно-сосудистым риском в комбинации со стандартной терапией сердечно-сосудистых заболеваний	A10BK01
464	Вилдаглиптин	Vildagliptinum	*Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 (DPP-4)	A10BH02
Глава 49. Лекарственные средства для лечения гипогликемии				
465	Глюкагон	Glucagonum		H04AA01
Глава 50. Гормоны щитовидной железы и антитиреоидные средства				
466	Левотироксин	Levothyroxinum natrium	[c]	H03AA01
467	Пропилтиоурацил*	Propylthiouracilum	*Для применения, когда альтернативное лечение первой линии не подходит или недоступно; пациенткам в течение первого триместра беременности	H03BA02
468	Тиамазол □	Thiomazolum	*Тиреотоксикоз	H03BB02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Глава 51. Лекарственные средства для лечения заболеваний гипофиза				
469	Каберголин □	Cabergolinum		G02CB03 N04BC06
470	Октреотид	Octreotidum		H01CB02
471	Бромокриптин	Bromocriptinum	*Альтернатива каберголину	G02CB01 N04BC01
Раздел 18. Иммунобиологические средства				
472	Туберкулин	Tuberculinum	*Диагностическое средство для выявления туберкулезной инфекции: туберкулин (очищенный белковый дериват, PPD)	V04CF01
473	Моноклональные антитела к вирусу бешенства*	Anti-rabies virus monoclonal antibodies	*Включая биоаналоги	J06BB05
474	Противоядный иммуноглобулин*	Antivenom immunoglobulin		J06AA03
475	Дифтерийний антитоксин	Diphtheria antitoxinum		J06AA01
Раздел 19. Миорелаксанты				
476	Неостигмин	Neostigminum methylsulfas		N07AA01
477	Суксаметоний	Suxamethonii chloridum		M03AB01
478	Атракурий* □	Artacurium		M03AC04
479	Векуроний □ [c]	Vecuronium	*Альтернатива: атракурий	M03AC03
Альтернативные лекарственные средства				
480	Пиридостигмин	Pyridostigminum		N07AA02
481	Цисатракурий	Cisatracurium	*Альтернатива: атракурий	M03AC11

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
Раздел 20. Офтальмологические лекарственные средства				
Глава 52. Противомикробные средства				
482	Ацикловир	Aciclovirum		S01AD03
483	Азитромицин*	Azithromycinum		S01AA26
484	Эритромицин*	Erythromycinum	[c] *Инфекции, связанные с хламидиями или гонореей	S01AA17
485	Офлоксацин* □	Ofloxacinum	*Бактериальный блефарит, бактериальный конъюнктивит	S01AE01
486	Тетрациклин □	Tetracyclinum	*Бактериальный блефарит, бактериальный конъюнктивит, бактериальный кератит, трахома	S01AA09
487	Тобрамицин	Tobramycinum	*Бактериальный блефарит, бактериальный конъюнктивит	S01AA12
Альтернативные лекарственные средства				
488	Левофлоксацин	Levofloxacinum	*Альтернатива офлоксацину	S01AE05
489	Моксифлоксацин	Moxifloxacinum	*Альтернатива офлоксацину	S01AE07
Глава 53. Противовоспалительные средства				
490	Преднизолон □	Prednisolonum		S01BA04 S01CB02 S03BA02
Глава 54. Местные анестетики				
491	Тетракаин □ [a]	Tetracainum	[a] Не применять для лечения новорожденных	S01HA03
Глава 55. Миотические и противоглаукомные средства				
492	Ацетазоламид	Acetazolamidum		S01EC01
493	Пилокарпин □	Pilocarpinum		S01EB01
494	Тимолол □	Timololum		S01ED01
495	Латанопрост	Latanoprostum		S01EE01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Альтернативные лекарственные средства				
496	Бримонидин	Brimonidinum	*Альтернатива тимололу	S01EA05
497	Дорзоламид	Dorzolamidum	*Применяется при открытоугольной глаукоме	S01EC03
498	Тимолол + дорзоламид	Dorzolamide + timololum	*Применяется при открытоугольной глаукоме	S01ED51
Глава 56. Мидриатические средства				
499	Эпинефрин	Epinephrinum	Глазные капли 2 % (в виде гидрохлорида)	S01EA01
Глава 57. Препараты противососудистого эндотелиального фактора роста (VEGF)				
500	Фарицимаб ±	Faricimabum	*Препарат для лечения ретинопатии	S01LA09
Раздел 21. Лекарственные средства для репродуктивного здоровья и перинатальной помощи				
Глава 58. Контрацептивы				
501	Этинилэстрадиол □ + левоноргестрел □	Aethinyloestradiolum + levonorgoestrelum		G03AA07
502	Этинилэстрадиол □ + норэтистерон □	Aethinyloestradiolum + norethisteronum		G03AA05
503	Левоноргестрел	Levonorgoestrelum		G03AD01
504	Улипристал	Ulipristalum		G03AD02
Глава 59. Инъекционные гормональные средства				
505	Медроксипрогестерона ацетат	Medroxyprogesteronum acetate		G03DA02
506	Норэтистерона энантат	Norethisteronum enantatum		G03DC02
507	Эстрадиола ципионат + медроксипрогестерона ацетат	Estradiolum cypionate + medroxyprogesteronum acetate		G03FA12

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
Глава 60. Стимуляторы овуляции				
508	Кломифен	Clomifenum		G03GB02
509	Летрозол*□	Letrozolum		L02BG04
Альтернативные лекарственные средства				
510	Анастразол	Anastrozolum	*Альтернатива летрозолу	L02BG03
511	Фоллитропин альфа ±	Follitropinum alfa	*Бесплодие, обусловленное гипоталамо-гипофизарной дисфункцией, сопровождающееся олиго- или аменореей (в сочетании с хорионическим гонадотропином), процедура суперовуляции	G03GA05
512	Фоллитропин альфа + лутропин альфа	Follitropinum alfa + lutropinum alfa	*Стимуляция развития фолликулов у женщин с тяжелой недостаточностью секреции лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов (гипогонадотропный гипогонадизм)	G03GA
513	Хориогонадотропин альфа	Choriogonadotropinum alfa	*Индукция множественного созревания фолликулов для вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)	G03GA08
Глава 61. Утеротоники				
514	Мизопростол*	Misoprostolum	*Лечение неполного аборта и выкидыша, профилактика и лечение послеродового кровотечения, где окситоцин не доступен или не может быть безопасно применен. *Только для использования в целях стимулирования родов при наличии соответствующих условий	G02AD06
515	Окситоцин	Oxytocinum		H01BB02
516	Мифепристон + мизопростол*	Mifepristonum + misoprostolum	*Лечение внутриутробной гибели плода, ведение искусственного аборта	G03XB51
517	Карбетоцин	Carbetocinum	*Альтернатива окситоцину	H01BB03
518	Метилэргометрин	Methylergometrinum		G02AB01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Глава 62. Токолитики				
519	Нифедипин	Nifedipinum		C08CA05
Глава 63. Другие лекарственные средства, применяемые в период беременности, родов и послеродового периода				
520	Дексаметазон	Dexamethasonum		H02AB02
521	Транексамовая кислота	Tranexamic acidum		B02AA02
Глава 64. Лекарственные средства, применяемые у новорожденных				
522	Кофеина цитрат [с]	Coffeinum citratis		N06BC01
523	Хлоргексидин [с]	Chlorhexidinum	[с]	B05CA02 D08AC02 D09AA12 R02AA05
Альтернативные лекарственные средства				
524	Простагландин Е1 (алпростадил) [с]	Prostaglandinum E1	*Врожденные ductus-зависимые пороки сердца у новорожденных (для временного поддержания функционирования артериального протока до проведения реконструктивной кардиохирургической операции), в т. ч. митральная атрезия, атрезия легочной артерии, трехстворчатого клапана, тетрада Фалло	C01EA01
525	Сурфактант ± [с]	Surfaktantum	*Респираторный дистресс-синдром у недоношенных новорожденных детей	R07AA02
526	Ибупрофен [с]	Ibuprofenum		C01EB16
Раздел 22. Раствор для диализа				
527	Внутрибрюшинный раствор для диализа	Intraperitonial solution for dialisum		B05D
Раздел 23. Лекарственные средства, применяемые при психических и поведенческих расстройствах				
528	Флуфеназин**	Fluphenazinum	*Альтернатива: галоперидола деканоат, зуклопентизола деканоат	N05AB02
529	Галоперидол**	Haloperidolum		N05AD01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
530	Оланзапин**	Olanzapinum		N05AH03
531	Рисперидон** □	Risperidonum		N05AX08
532	Амитриптилин**	Amitriptylinum		N06AA09
533	**Флуоксетин* □	Fluoxetinum		N06AB03
534	Карбамазепин**	Carbamazepinum		N03AF01
535	Лития карбонат**	Lithium carbonatum		N05AN01
536	Кветиапин** □	Quetiapinum		N05AH04
537	Вальпроевая кислота**	Acidum valproicum		N03AG01
538	**Диазепам* □	Diazepamum	*Использовать только в короткий период для лечения острого или тяжелого тревожного расстройства	N05BA01
539	Кломипрамин**	Clomipraminum		N06AA04
540	Гидроксизин**	Hydroxyzine		N05BB01
541	Алпразолам**	Alprazolam		N05BA12
542	Клоназепам**	Clonazepam		N03AE01
543	Клозапин**	Clozapinum		N05AH02
Альтернативные лекарственные средства				
544	Хлопромазин**	Chlorpromazinum	*Альтернатива галоперидолу	N05AA01
545	Пароксетин**	Paroxetinum	*Альтернатива флуоксетину	N06AB05
546	Сертралин**	Sertralinum	*Альтернатива флуоксетину	N06AB06
547	Эсциталопрам**	Escitalopramum	*Альтернатива флуоксетину	N06AB09
548	Циталопрам**	Citalopramum	*Альтернатива флуоксетину	N06AB10
549	Лоразепам**	Lorazepamum	*Альтернатива диазепаму	N05BA06

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
Раздел 24. Лекарственные средства, применяемые при расстройствах из-за употребления психоактивных веществ				
Глава 65. Лекарственные средства, применяемые при алкогольной зависимости				
550	Акампросат кальция	Acamprosatum calcium		N07BB03
551	Налтрексон	Naltrexonum		N07BB04
552	Дисульфирам	Disulfiramum		N07BB01
Глава 66. Лекарственные средства, применяемые при никотиновой зависимости				
553	Бупропион ±	Bupropionum		N06AX12
554	Цитизин	Cytisinum		N07BA04
555	Варениклин ±	Vareniclinum		N07BA03
Глава 67. Лекарственные средства, применяемые при опиодной зависимости				
556	Метадон*** □	Methadonum		N07BC02
557	Бупренорфин***	Buprenorphinum		N07BC01
Раздел 25. Лекарственные средства, действующие на дыхательные пути				
Глава 68. Лекарственные средства, применяемые при бронхиальной астме и хронической обструктивной болезни легких				
558	Будесонид □	Budesonidum		R03BA02
559	Эпинефрин	Epinephrinum		R03AA01
560	Ипратропия бромид*	Ipratropii bromidum		R03BB01
561	Тиотропия бромид	Tiotropium bromide		R03BB04
562	Сальбутамол □	Salbutamolum		R03AC02
563	Будесонид □ + формотерол □	Budesonidum + formoterolum		R03AK07
Альтернативные лекарственные средства				
564	Беклометазон	Beclometasonum	*Альтернатива будесониду	R03BA01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
565	Флутиказон	Fluticasonum	*Альтернатива будесониду	R03BA05
566	Тербуталин	Terbutalinum	*Альтернатива сальбутамолу	R03AC03
567	Беклометазон + формотерол	Beclometasonum + formoterolum	*Альтернатива будесонид + формотеролу	R03AK08
568	Флутиказон + салметерол	Salmeterol + fluticasone	*Альтернатива будесонид + формотеролу	R03AK06
Глава 69. Лекарственные средства, применяемые при легочной артериальной гипертензии				
569	Силденафил	Sildenafilum	*Применяется при легочной артериальной гипертензии	G04BE03
Раздел 26. Растворы для коррекции водных, электролитных и кислотно-щелочных нарушений				
Глава 70. Пероральные растворы				
570	Соли для пероральной регидратации	Oral rehydration salts		A07CA
Глава 71. Парентеральные растворы				
571	Глюкоза	Glucosum		B05BA03
572	Глюкоза с натрия хлоридом	Glucosum with sodium chloridum	*[c]*	B05BB02
573	Калия хлорид	Potassium chloridum	*[c]*	B05XA01
574	Натрия хлорид	Sodium chloridum		B05XA03
575	Натрия гидрокарбонат	Sodium hydrogen carbonatum		B05XA02
576	Раствор Рингера	Ringer's solution		B05BB01
Альтернативные лекарственные средства				
577	Натрия хлорид гипертонический раствор	Sodium chloride hypertonic solution	*Применяется при отеке мозга	B05XA03

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
578	Альбумин	Albuminum	*Применяется после процедуры парацентеза для профилактики дисциркуляторной дисфункции. *Применяется при кардиогенном и септическом шоке	B05AA01
Раздел 27. Витамины и минералы				
579	Кальция глюконат	Calcium		A12AA03
580	Эргокальциферол □	Ergocalciferolum		A11CC01
581	Холекальциферол □ [с]	Cholecalciferolum		A11CC05
582	Пиридоксин	Pyridoxinum		A11HA02
583	Тиамин	Thiaminum		A11DA01
Раздел 28. Лекарственные средства для болезней уха, горла и носа				
584	Будесонид □ [с]	Budesonidum		R01AD05
585	Ципрофлоксацин □ [с]	Ciprofloxacinum		S03AA07
586	Ксилометазолин □ [с]	Xylomethazolinum		R01AA07
Раздел 29. Лекарственные средства для лечения заболеваний суставов				
Глава 72. Лекарственные средства, применяемые для лечения подагры				
587	Аллопуринол	Allopurinolum		M04AA01
Глава 73. Болезнь-модифицирующие агенты, применяемые при ревматических расстройствах (DMARDs)				
588	Хлорохин	Chloroquinum		P01BA01
589	Азатиоприн	Azathioprinum		L04AX01
590	Метотрексат	Methotrexatum		L04AX03
591	Сульфасалазин	Sulfasalazinum		A07EC01
592	Пеницилламин	Penicillaminum		M01CC01
593	Гидроксихлорохин	Hydroxychloroquinum		P01BA02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
Глава 74. Лекарственные средства, применяемые при ювенильных заболеваниях суставов				
594	Ацетилсалициловая кислота*	Acetylsalicylic acidum	*Для применения при ревматической атаке, ювенильном артрите, болезни Кавасаки	N02BA01
595	Адалимумаб* ±	Adalimumabum	[c]	L04AX03
596	Метотрексат	Methotrexatum		L04AX03
597	Триамцинолон	Triamcinolonum hexacetonide		H02AB08
598	Тоцилизумаб ±	Tocilizumabum		L04AC07
599	Метилпреднизолон	Methylprednisolonum	[c]	H02AB04
Раздел 30. Лекарственные средства, применяемые при гемодиализе				
600	Севеламер	Sevelamer	*Контроль гиперфосфатемии у взрослых пациентов, находящихся на гемодиализе или перитонеальном диализе	V03AE02
601	Финеренон	Finerenonum	*Лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа	C03DA05
Раздел 31. Лекарственные средства, применяемые при орфанных заболеваниях				
602	Окрелизумаб ±	Ocrelizumabum	*Применяется для лечения рецидивирующего рассеянного склероза (РРС) и первично-прогрессирующего рассеянного склероза (ППРС). Альтернатива ритуксимабу	L04AG08
603	Рисдиплам ±	Risdiplamum	*Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА)	M09AX10
604	Имиглюцераза ±	Imiglucerasum	*Применяется для лечения болезни Гоше	A16AB02
605	Элтромбопаг ±	Eltrombopagum	*Применяется для лечения хронической иммунной тромбоцитопении	B02BX05
606	Эволокумаб ±	Evolocumabum	*Применяется у взрослых для лечения первичной гиперхолестеринемии, включая гетерозиготную семейную и несемейную формы (тип IIa по классификации Фредриксона), смешанной гиперлипидемии (тип IIb) и гипертриглицеридемии (тип IV)	C10AX13

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
607	Бозентан ±	Bosentanum	*Применяется при легочной артериальной гипертензии	C02KX01
608	Дорназа-альфа ±	Dornasum-alfa	*Применяется при муковисцидозе	R05CB13
609	Пирфенидон ±	Pirfenidonum	*Применяется при идиопатическом легочном фиброзе	L04AX05
610	Экулизумаб ±	Eculizumabum	*Применяется при миастении Гравис	L04AA25
611	Эмицизумаб* ±	Emicizumabum	*Применяется при гемофилии	B02BX06
612	Иммуноглобулин антитимоцитарный ±	Anti-T lymphocyte immunoglobulin	*Применяется при пересадке органов	L04AA03
Раздел 32. Вакцины				
613	Вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи	Morbilli, combinations with parotitis and rubella, live attenuated vaccine	12 месяцев, 2 года (ревакцинация)	J07BD52
614	Вакцина против кори и краснухи	Morbilli, combinations with rubella vaccine	12 месяцев, 2 года (ревакцинация)	J07BD53
615	Вакцина против краснухи	Rubella vaccine	12 месяцев, 2 года (ревакцинация)	J07BJ01
616	Вакцина для профилактики кори	Morbilli, live attenuated vaccine	12 месяцев, 2 года (ревакцинация)	J07BD01
617	Вакцина для профилактики эпидемического паротита	Parotitis vaccine	12 месяцев, 2 года (ревакцинация)	J07BE02
618	Вакцина для профилактики гемофильной инфекции	Hemophilus influenzae B vaccine	2, 3,5 и 5 месяцев	J07AG01
619	Вакцина против вирусного гепатита В	Hepatitis B vaccine	0 (рождение), 2, 3,5 и 5 месяцев	J07BC01
620	БЦЖ-вакцина активная специфическая вакцина	BCG-vaccine	0 (рождение)	J07AN01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
	для профилактики туберкулеза			
621	Инактивированная полиовакцина трехкомпонентная	Inactive poliomyelitisvaccine types 1, 2 and 3	3,5 и 9 месяцев	J07BF03
622	Бивалентная оральная вакцина от полиомиелита 1 и 3 типа	Bivalent oral vaccine of poliomyelitis types 1 and 3	2, 3,5 и 5 месяцев	J07BF02 J07BF04
623	Моновалентная оральная вакцина от полиомиелита	Monovalent oral vaccine of poliomyelitis	По эпидемиологическим показаниям	J07BF01
624	Новая оральная полиомиелитная вакцина типа 2 (нОПВ2)	New oral polio vaccine type 2 (nOPV2)	По эпидемиологическим показаниям	J07BF02
625	АКДС-вакцина адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина	Adsorbed diphtheriae pertussis – tetanus vaccine	2 года	J07CA02
626	Пентавалентная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша (полноклеточного), вирусного гепатита В (АКДС + ВГВ + ХИБ)	Pentavalent combination vaccine (DTP + HBV + Hib)	2, 3,5 и 5 месяцев	J07CA09

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
627	Гексавалентная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша (ацеллюлярная), вирусного гепатита В, полиомиелита и ХИБ-инфекции	Hexavalent combination vaccine (diphtheria, tetanus, fullcellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliomyelitis and Hib vaccine)	2, 3, 4 месяцев	J07CA09
628	АДС-вакцина	Adsorbed diphtheriae et tetanus vaccine	6 лет	J07AM51
629	АДС-М вакцина	Adsorbed diphtheriae et tetanus vaccine (for adults)	11, 16 лет и далее каждые 10 лет	J07AM51
630	Пневмококковая 13-валентная конъюгированная вакцина (ПКВ)	Pneumococcal 13-valent conjugate vaccine	2, 5, 12 месяцев	J07AL02
631	Пневмококковая 10-валентная конъюгированная вакцина (ПКВ)	Pneumococcal 10-valent conjugate vaccine	2, 5, 12 месяцев	J07AL02 J07AL52)
632	Пневмококковая 23-валентная конъюгированная вакцина (ПКВ)	Pneumococcal 23-valent conjugate vaccine	С 2 лет (по показаниям)	J07AL02
633	Ротавирусная вакцина жидкая оральная	Rotavirus	2, 3,5 и 5 месяцев	J07BH J07BH01 J07BH02

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классификация
634	Вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная	Vaccine against human papillomavirus quadrivalent recombinant	11 лет	J07BM01
635	Вакцина против вируса папилломы человека 9-валентная (рекомбинантная, адсорбированная)	Human papillomavirus 9-valent vaccine (recombinant, adsorbed)	11 лет	J07BM01
636	Менингококковая вакцина	Meningococcus polysaccharide vaccine	По эпидемиологическим показаниям	J07AH01 J07AH02 J07AH03 J07AH04 J07AH05 J07AH06 J07AH07 J07AH08 J07AH09 J07AH10 J07AH11
637	Вакцина антирабическая инактивированная (лиофилизированная)	Rabies vaccine inactivated (lyophilized)	Вводится в 0, 3, 7, 14 и 28 дни после контакта	J07BG01
638	Вакцина противочумная живая (чума инактивированная, целая клетка)	Live plague vaccine	Ежегодно лицам, относящимся к группам риска	J07AK01

№	Международное непатентованное наименование (МНН)	Наименование на латинском или английском языке	Примечание	АТХ-классифика-ция
639	Вакцина против клещевого вирусного энцефалита	Tick-Borne encephalitis vaccine (inactivated)	С 1 года жизни	J07BA01
640	Иммуноглобулин человеческий нормальный	Human normal immunoglobulin	По эпидемиологическим показаниям	J06BA01 J06BA02
641	Антитоксин столбнячный	Teanus toxoid	По эпидемиологическим показаниям	J06AA02

Примечание. Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств (далее – Перечень) составлен на основе Примерного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (24-е издание, 2025 год) и Примерного перечня основных лекарственных средств для детей Всемирной организации здравоохранения (10-е издание, 2025 год), опубликованных 5 сентября 2025 года.

В настоящем Перечне противомикробные средства разделены на группу общего доступа (Access), группу, требующую особого наблюдения (Watch), и группу резерва (Reserve).

По всем лекарственным средствам представлены коды по анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ-коды) при определенных условиях в зависимости от профиля применения, а также рекомендации по их применению при определенных состояниях и заболеваниях, основанные на международных или национальных клинических руководствах.

Дополнительные и альтернативные лекарственные средства отражены в рамках фармакологического класса или химической подгруппы, определенной по 4-му и 5-му уровням АТХ-классификации, которые обладают сходной клинической эффективностью и безопасностью.

В настоящем Перечне используются следующие условные обозначения:

 – лекарственное средство, включенное в настоящий Перечень, является примером лекарственных средств с наилучшими доказательствами эффективности и безопасности. При этом могут применяться лекарственные

средства этой же фармакологической группы по наиболее доступной цене, если данные об их эффективности и безопасности не отличаются друг от друга. В настоящий Перечень включаются лекарственные средства, которые, как правило, доступны по наиболее низкой цене, исходя из международных источников информации о ценах на лекарственные средства. Не все лекарственные средства, указанные в квадратных скобках, применимы в качестве лекарственных средств выбора для детей;

[a] – означает противопоказания к применению лекарственного средства, в зависимости от возраста и веса пациента;

[c] – применение лекарственного средства требует специализированного диагностического/мониторингового оборудования и (или) врача узкой специальности, указание символа в дозировке означает, что существуют особые указания по ограничению его применения детьми;

[c] – для применения у детей требуется специальное оборудование для диагностики или мониторинга и (или) специализированная медицинская помощь, и (или) специальная подготовка;

* – особые показания к применению либо указание на то, что лекарственное средство включено в клинические руководства/протоколы, утвержденные уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения, или имеются особые указания при использовании данного лекарственного средства;

** – лекарственное средство относится к психотропным средствам, подлежащим контролю в Кыргызской Республике, отпускается строго по рецептам соответствующего образца и подлежит предметно-количественному учету;

*** – лекарственное средство относится к наркотическим средствам, подлежащим контролю в Кыргызской Республике, отпускается строго по рецептам соответствующего образца и подлежит предметно-количественному учету;

± – лекарственное средство включено в настоящий Перечень только для улучшения его физической доступности для пациентов и относится к категории дорогостоящих (высокозатратных) препаратов;

[r] – лекарственное средство относится к противомикробным средствам, требующим рецептурного отпуска.